

мыты (χανδεῖς ταφροῦς) на искыты на Европе и пр. Где-то цветет край Италия, корень-ти мѣсѧцъ даляетъ, стебла-та мѣсѧцъ лиши много, травами, листами и высоки до единъ ноги, листы-ти имѣютъ много, длинноваты, звѣздасты, чистозѣлены, изъ троны танки, валикъ въсю и благата, цвететъ имѣютъ изъ подобии изъ националь-тѣ градинникъ, изъ малки и жальти.

Винчка-та трава употребляется въ медицинѣ-тѣ на дикото-то, имѣ вѣсъ вѣма горчица.

Сила. Мало успабително и противотревеско.

Употреблена на болѣсты желудачны, на ревматизмъ (наиморѣзъ) детски, на тревесы прѣбѣвателни на мешко расположеніе.

Доза. др. 10 изъ водя брѣмѣнъ др. 100.

{	Аконитъ напѣль Бал.	Ахонитъ <i>υαπέλλογ</i> , Бал.
	Аконитъ изъ напѣль, Лат.	Аконитъ напѣль, Фр.
	Аконитъ Напѣло, Ит.	

Классъ 15. Многомажное. Чина 3. Трижды.

Виждь фиг. 10, изъ 1-й Тома на рѣч. Бот.

§. 1066. Многоживущее то-това растѣніе искыне въ падинны-ты на Европе и Греции, стебло-то мѣсѧцъ е право, листоносно и цилиндрическо, вѣзвышавася до два или три ноги, то гдѣ свѣршава на единихъ классахъ (*στάχυς*) густы; листы-ти мѣсѧцъ изъ раковидны какъ-то длинны-та на рѣвѣ-ты, раздѣлены на много листицъ; тѣ же гладки изъ краскъ тѣмнозѣлены, цвететъ имѣютъ изъ густы, и голѣми, Петалы-та на конъ-то е вѣзды на шлемъ (*περικεղαλα*) тѣже; петали-ти на цвететъ-ты изъ пять и голѣми. Винчка-та трава употребляется на медицинѣ-тѣ въ прахъ, или става на иноподътой имѣ уханіе досадно и вѣсъ трѣпка.

Сила. Вѣма успабително и адсорбенто.

Употреблена на хроническо теченіе, на амаврозисъ, на утичаніа на гланзы-ты и на юдъ отъ Наполеон-тѣ змѣй.

Доза. Отъ листы-ты по зерна 1 до 4, многажды на день изъ сахара.

7 видовъ аконитъ сѧ находятся.

{	Замѣзка или бжѣзъ, Бал.	Актѣ, Бал.	Коуфосилеа, Пр.
	Замѣзка, Лат.	Сирѣе Ординѣ, Фр.	
	Замѣзко комѣне, Ит.	Мурвѣрхъ лагачъ, Гре.	