

Винка та трава са употребавава въ медицинж-тж.

Сила. Та е услабителна и умагкнителна.

Употребленіе. Отзвжтрѣ на болѣсты грѣдны, на кашлицж-тж на кашахж-тж и странгуріеж-тж и на констипаціеж-тж. Отзвиз на утичаніа и на чрѣзміриеж горѣщих на долнеж-тж утробж.

Дозъ. На корены-ты др. 8, въ водж вѣрѣж др. 100 за да възвжртз доврѣ и да са піе часто.

{	Алой, Бл.	Алоѣ, Бл.	Алоѣж, Лат.
	Алоѣ, Фр.	Алоѣ, Ит.	Секѣрз Ѡтѣ, Тѣр.

Классъ 6. Шестомѣжно. Чинъ 1. Единоженно.

Видъ фиг. 15 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1069. Алой-тж е растѣніе многожизѣще, никне въ Африкж, Азіѣж, и пр. и въ извы-ты на кѣшы-ты; пораства ствало-то мѣ до 5 ногы, и е дръвасто, и пои цвѣтѣе жьлтиникави и баналобидни; листи-ти на Алой-тж сж сабелоподобни, голѣми, зѣбасти и кѣлозелени. Е и единъ видъ агавѣа называемъз и никне въ Европж и пр. дѣто издава цвѣтз междѣ 20 и 30 годинах на възрѣста ин; ствало-то ѣ са възвышава до 15 ногы, ксе-то има на врѣха омѣрѣловидни цвѣтѣе жьлти; дръво-то ꙗкоа Оттомани-ти го наричжтз савѣрж Ѡтѣ, и Гръци δενδρον τῆς υπομονῆς. Българскы дръво на трѣпѣніе-то; отз бж-ты нхуны листѣе става рична-на-та влада; та като изгжхне става агкый-тж алой, кой-то има вкѣз догаденъз и прѣгорчѣж.

Сила. Учищителенъз и раздаражителенъз на право-то чрѣво, и на митрж-тж, рѣсый-тж алой е докѣрз а нѣ чръный-тж.

Употребленіе. На констипаціеж-тж, на сморонды-ты, или нхуно-то прѣставаніе.

Дозъ. На прахъ по 10 зръна до 30 гж захаръ.

32 видѣе алой нахожджтса написани въ Лекконда.

{	Пепѣровъ корень, Бзл.	Αρρωστον ζενζιβερ, Бл.
	Пиперѣрѣѣа, Простогр.	Зинзѣрз Фр.
	Зѣнзѣро, Ит.	Джѣнджефіаз, Тѣр.

Классъ 1. Едномѣжно. Чинъ 1. Единоженно.