

Класъ 5. Патоложно. Чинъ 2. Двоженно.

Вижда фиг. 25 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1074. Анидз-тз е естественнo годишнъ, произходящъ изъ Египетъ; той сѣ дикъ въ много страны по Европѣ. Край Іѳіа и Іѳіа мѣсца цвѣти; клонове-ти мѣ сѣ танки, листи-ти мѣ лѣжжтз еднакво и танки, вѣн-ти зѣленикави; въ вѣрѣхъ на клонове ты лѣжжтз смърлобидни-ти мѣ цвѣтове, мааки и бѣли, плодове-ти мѣ сѣ иѣкон зрѣла дрѣвни, кон-то имѣтз уханіе ароматно, и въсѣз сладчивъ.

С и л а. Укрѣпителнъ.

Употрѣбленіе. На испищевареніе, на колики и въздушни колики на сморонды ты, на истеризма.

Дозъ. На гѣмина та др. 8 въ водѣ вѣрѣж др. 100.

Два видове аниди сѣ овщій-тз и лѣчистый-тз.

{ Аристолохіа климатическа, Бл. *Aristolochia climacis*, Гр.
Арист. климатическа Лат. Ит. Аристолохъ климатическа, Фр.
Джеранбеді мюдеверъ Тѳр.

Класъ 20. Женномжно. Чинъ 4. Шестомжно..

Вижда фиг. 26 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1075. Аристолохіа сѣ нарѣча това растѣніе отъ Гръцкы *ἄριστος* прѣдозрѣ и *λόχη* анхиваніе, защото то на старо вѣрѣмѣ весьма помагало на породе-ты женскы и на нѣхны ты мѣсачины; то е едно растѣніе многоживуще, и никне въ лѣста необработаны, и планины, гдѣ-то цвѣти край Іѳіа мѣсца, корень-тз ѣе дълговатъ и сѣ жнакъ, стебла-та ѣе сѣ равни, высоки до двѣ ноги, листи-ти ѣе сѣ еднакви, сръдцобразни, сѣ кракж чистозѣленъ сѣ много нервы, цвѣтове-ти сѣ жълтозѣлени сѣ единж-тж четнж [дълговатъ, употребявайтсѣ въ медицинж-тж корени-ти ѣе.

С и л а. Укрѣпителна и раздражителна на кръвиж-тж системѣ и менагогическа и непотивателна.

Употрѣбленіе. На хлорозисъ кахексисъ, породе, и ематоріжъ.
Дозъ. Др. 2, въ водѣ вѣрѣж др. 100.

{ Аристолохіа серпентаріа, Бл. *Aristolochia serpentaria*, Гр.
Аристолохіа серпент. Лат. Серпентеръ виржиніеръ, Фр.
Серпентаріа виржиніана, Ит. Вин-диана кондра гѣрваси, Тѳр.