

Классъ 19. Средствено. Чинъ 1. Многоженіе.

Видъ фиг. 29. въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1078. Това растѣніе е двегодишно, никне по воды ты и погоры-ты на Европѣ, цвѣти край Іуліа и Августа мѣсяца, корени-ти мѹ съ цилиндрически, стебла-та мѹ трапѣны, и праздни отъ вѣтрѣ, тѣ са възвышаватъ отъ 3 до 4 ноги, листи-ти мѹ съ широки като крапѣ (мандназ), за то и по простогръцкы называлоса това растѣніе *πυλαγομήρηλα*, тѣ съ быти, зѣленикавы и вѣлиовни (*χυκατόμη*), вкѹз имѣтъ вѣсма горчивѣ, цвѣтосѣ-ти нмѣ съ като на кинарѣ-тѣ, чрвѣникавы и голѣми. Употрѣблява-тея въ медицинѣ-тѣ корени-ти нмѣ въ дѣкото.

С и л а. На корени-ты, ѹкрѣпителни и разхладителни.

Употрѣбленіе. На подаггѣ, артритъ, ревматизмы; ерпы сръбелъ, малафранцавы болѣеты и страданіѣ на кож-тѣ.

Дозъ. На корени-ты др. 10, въ водѣ вѣрѣж др. 100 да са взема прѣзъ вѣничкый тѣ день.

Иль видове Глѹтеронъ са нахожда.

{ Пелінь, Кал. *Artemisia*, Вел. *Aphthion*, Простегр.
 Артемисъ а апсіндѹмъ Лат. Апсіндъ комѣнъ, Фр.
 Апсінцо Ит. Пелінь отъ. Тѣр.

Классъ 19. Средствено. Чинъ 2. Многоженіе изливше.

Видъ фиг. 50 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1079. Апсінцо-то или пелінь тѣ е растѣніе многожнѣще, то никне въ мѣста необработаны и въ градины-ты (*) гдѣ то цвѣти по Августа мѣсяца, корень-тѣ мѹ е дѣкъ, стебла-та мѹ съ прави, носѣтъ на брѣха си листове и цвѣтосѣ въ видѣ тирѣ; цвѣтосѣ-ти мѹ съ въ видѣ на гроздѣ; прави, полѣкрѣгли, жѣлтиника-вы и вѣсма много на число.

Вѣничка-та трава са употрѣблява въ медицинѣ-тѣ, кол то има уханіе тѣжко и вкѹз горчивѣ.

С и л а. Услабителенъ, антелментическъ и горчивъ.

(*) Въ Молдавіѣ (Богданіѣ) пѣли са ливади-ти отъ Пон-танъ пелінь, отъ кон-то правѣтъ твѣрдѣ горчивѣ-тѣ мѹ соль.