

Дозъ. По 6 зръна до 50 на прахъ. полз др. до 1 въ водѣ
др. вѣжъ др. 60 съ захаръ.

{ Гентіана, Ел. *Gentiana*, Ел.
Гентіана, Лѣтеа, Лат. Гентіанъ дѣтркѣръ, Фр.
Генціана, Ит. Силтіанъ ѿтъ, Тѣр.

Класъ 5. Патомжно. Чинъ 2. Двомжно.

Вижь фнг. 38 въ 1-ый Т. на рѣч. Бот.

§. 1086. Гентіана та е растѣніе многоживно, кое-то никне въ планины-ты высокы на Италіѣж, Германіѣж и Греціѣж, най-паче въ горъ-тж Пинскѣж въ Фессаліѣж, гдѣ-то цвѣти край Іюліа мѣсѣца; стебло то ѿ са възвышава до еднѣ ногъ или н двѣ, то е травяно, гладко, и право, листи-ти мѣ зѣлени и съ много жилкы, цвѣтѣ-ти мѣ лѣжѣтъ въ вѣрха въ видъ на коносъ, и порфирни или жълтеникави.

Корень тж е дъгъж, дъжъ съ краикѣж жълтѣж, той има кѣкъ горчѣвъж, уханіе не има, кой-то са употрѣбѣлава въ Медицинж-тж.
Сила. Малко ѹслабителна.

Четырѣдесѣтъ видове на Гентіана-та са нахождѣтъ.

Употрѣбленіе. На страданіѣ желѹдъчны и червны, на трѣскы приѣквателны, хлорознѣж, жълтеницѣж и еминиды.

Дозъ. На корена, др. 8, въ вѣжъ водѣ др. 150.

{ Сладкъ корень, Ел. *Глукѹрріца*, Ел.
Гликориза. Лат. Реглиъ ѿффициналъ, Фр.
Ликѹриціа, Ит. Милъж кикъ, Тѣр.

Класъ 17. Двообратни. Чинъ 4. Десѣтомжно.

Вижь фнг. 40 въ 1-ый Т. на рѣч. Бот.

§. 1087. Сладкъ-тж корень е растѣніе многоживно, кое-то никне въ топлы климаты на Италіѣж и Востокъ, гдѣ-то цвѣти край Іюліа мѣсѣца; корени-ти мѣ съ дъгъж, пазни съ еднѣ жидкостъ сладкъ и доврокъѹниж; отрасли-ти мѣ съ дъгъговати, възвышаваѣтъ до 4 ногы, листи-ти имъ съ крыласты и айцѣвидни, калкиж-тж имъ е раздѣленъ на двѣ ѹстны, цвѣтѣ-ти имъ съ дъгъговати въ видъ на дѣреа. Употрѣбѣлаваѣтъ въ медицинж-тж корени-ти, и вихъ-то екстрѣто.

Сила. На корени-ты ѹмѣгкчителни и захарни.