

вазѣтъ отъ корены-ты голѣми, съ краскѣ зеленочрнѣх, раздѣ-
лени на осмь или 9 листенца, употрѣбаватъ въ медицинѣ-тѣ
тѣнкы-ты мѹ коренче-та.

Сила. Услабителни, раздражителни и сианоуцнителни.

Употрѣбленіе. Отъ бѣтрѣ на меланхоліѣ-тѣ, маниѣк,
и еминиды, и лѹдобѣ на пѣкѣи.

Доза. 1 др. въ водѣ брѣлаж др. 50.

Блабори съ 10 видове.

{ Елѣнійна трава, Ел. *Eleonion d'ortor*, Ел. *Orator*, Пр.
Инола Елѣнійна, Лат. *Инола Елѣнійна*, Фр.
Енѣла камбана, Ит. *Индѣзз отѹ*, Тѹр.

Классъ 14. Сродственно. Чинъ 2. Многоженіе изашно.

Видѣ фиг. 55 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1100. Това растѣніе е многоживно, никне по болшей частѣ
по студены-ты канматы на Европѣ, гдѣ-то цвѣти по Іюліа и
Августа мѣсца, корень-тѣ мѹ е дивелъ, ароматенъ, стебло-то мѹ
е высоко, до тры ногы, листи-ти мѹ съ айшовидни, тріонжни,
цвѣтѣ-ти мѹ съ голѣми, на краскѣ златовиднѣх, употрѣбл-
ватѣа въ медицинѣ-тѣ и економіѣ-тѣ корени-ти мѹ на салатѣ.

Сила. Укрѣпително и андѣлметическо.

Употрѣбленіе. На непищевареніе то, и на еминиды-ты.

Доза. По полъ др. до 1 съ водѣ и захарѣ.

52 видове елѣнійна трава съ нахожда.

{ Торментина брѣкта, Ел. *Епѣдулло*, Ел.
Торментина брѣкта, Лат. *Торментина дроатъ*, Фр.
Офичинале, Ит. *Индживаръ*, Тѹр.

Классъ 12. Двадесатомжно. Чинъ 5. Патомжно.

Видѣ фиг. 56 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1101. Това малко растѣніе е многоживно, никне по-бѣче-
то по влажны-ты мѣста стебла-та мѹ съ вѣлма тѣнки, като ко-
смы комахай, корени-ти нмъ съ дръвѣсти, цвѣтѣ-ти малки съ
краскѣ златовиднѣх жѣлтѣх; употрѣбаватѣа въ лѣкарство-то ко-
рени-ти мѹ, и тѣ съ стиптически.

Употрѣбленіе. На хроническы-ты діарей, на дисентеріи-ты
и на падваніе то на мѣжѣца,