

видин, стебло-то мѣсѧцъ е тънко, цвѣткове-ти мѣсѧцъ лѣспави, и изображаватъ като единица цилиндрикъ лѣспавъ, и жълтиникавъ; коренин-ти мѣсѧцъ има же виши топълъ, горчика, и ароматенъ тажъки.

Употребляватъ въ медицинж-тж коренин-ти мѣсѧцъ на прахъ.

Сила. Укрепителни и убождателни.

Употребление. На стомахнически и чревни болѣстъ.

Доза. На прахъ по зърна 25 до единица драмъ.

Седмъ видове ароматни трости са наимиратъ.

Камфора, Бл. <i>Камфора</i> , Бл. <i>Камфора</i> , Пр. Лаврътъ камфора, Лат. <i>Лаврътъ камфоренъ</i> , Фр. Камфора, Ит. <i>Камфора</i> , Тѣр.	

Класъ 9. Деватомажно. Чинъ 1 Едноженно.

Виждъ фиг. 71 въ 1-ый Томъ на рѣч. Бот.

§. 1114. Това растѣніе е едно дрѣво многоживно отъ видъ-  
та на дафинж-тж (лабрж), то е всеса хвabo, никакъ не существуетъ  
въ по-вѣче-то страны на Индій и Кинѣ; стебло-то мѣсѧцъ е равно  
съ много клонове чревено чрънинави, листове-ти мѣсѧцъ съ яйцовидни,  
сизи и блестательни, подобни съ листы-ты на пиновиж-тж кръшъ  
прѣчисти; цвѣткове-ти мѣсѧцъ лѣжатъ въ връхове-ты на клонове-ты съ  
кракъ възъблѣдъ, плодъ-тж мѣсѧцъ е дрѣво иѣкои съ краинъ възърно  
чревенъ, всичко-то дрѣво го нащѣпватъ отъ кое-то истина една  
ричиняна жидкостъ и быстра какв-то и прозрачна, таъ камфора  
има уханіе сило и виши гораща, горчика и ароматенъ.

Сила. Тоническая и первы-ты и андементическая.

Употребление. На трѣски неврическои, на велика слабость  
на дланію, на тетани, маніїи и на гансты, въ епидемии-ты и еп-  
демии-ты да га ухадъ.

Доза. По зърна 2 до половина драмъ.

Дымна трака, Бл. <i>Калюсідес</i> , Бл. <i>Калюсідес</i> , Пр. Фумаріа <i>Фунциналисъ</i> , Лат. <i>Фумаріа</i> , Фр. Фумаріа лѣтъ, Ит. <i>Сахтаре</i> , Тѣр.	

Класъ 17. Двократни. Чинъ 3. Шестомажно.

Виждъ фиг. 73 въ 1-ый Томъ на рѣч. Бот.

§. 1115. Растѣніе едногодишно, кое-то никакъ по никакъ-ты