

Европж край Италия и Испания мѣсцахъ, корень тѣ мѣсѧца, живи-
ка вѣкъ (жизнѣцъ) и вѣзбѣлъ; стебла-та мѣсѧца полѣгнали и ли-
стоносны, прѣфирии чрьвени сирѣчъ; листове ти мѣсѧца двоокрылы
зѣлены отъ горѣ и острѣ. Класове те излазатъ на-спаси листы-
ты изъ много цвѣтова чрьвеника въ камѣ врѣхъ-та краевоцвѣтии,
всички цвѣтова сѣ на два вѣзла; винчко то растѣніе е безъзател-
но, вѣкъ има вѣсна горчица.

Сила. Малко отглабително и лакативно (жигутелю) на
влаги-ты,

Употребление. На испицевареніе-то (деспѣфлак), как-
всій, страданія немощны на жадавкѣ-та, ірпы и малѣлъ.

Доз. Др. 8 въ водѣ врѣмъ др. 100.

15 горта (видове) дынина трава сѧ налира по швы-ты.

{	Орѣхъ, Бл.	Карудла, Бл. и Пр.
	Інглицъ регіамъ, Лат.	Нѣръ колънъ, Фр.
{	Нѣче, Ит.	Джавізъ агачи, Тѣр.

Класъ 21. Самокашно. Чина 7. Многомажно.

Биѣдъ фиг. 74, въ 1-ый Томъ на рѣч. Бот.

§. 1116. Орѣхово-то дрѣво е многоживно, то сѧ нахожда
въ Болгаріѣ въ множествѣ; орѣхово-то дрѣво има корены мно-
го; стебла-та мѣсѧца вѣзвышаются до 30 или 40 крака; кората
имъ е бѣзчрина клонове-ти мѣсѧца трилистни, голѣли до 10 прѣ-
стове и 5 на ширѣ, тѣ сѧ зѣлены, елиптическа (като яйце) на
образъ и мало землини; листки-ти цвѣтова изображаватъ едини
вида опашка дѣлгж, лѣспава и цилиндрическа. Плодове-ти имъ сѧ
извѣстин-ти и познати-ти орѣхи; употребляватъ въ медицинѣ-
же винкашиж-же парегушиж.

Сила. Отглабително, гинитическо, и андементическо.

Употребление. На болѣнія на члѣнове ты, на болѣтвы
на кожж-та и инѣю үагицаваніе.

Доз. Драмове 4 въ водѣ врѣмъ др. 100 и да сѧ взема
часто изъ захара.

19 видови срѣхово дрѣвига сѧ находятъ на сѣѣта.

{	Орѣхово блюбателно дрѣво, Бл.	Карудла єметихъ, Бл.
	Патес хад фольес, Пр.	Стрѣхинъ вѣкъ болинка, Лат.
{	Ноакъ болинка, Фр.	Нѣче болинка, Ит.

Карга вѣкъ, Тѣр.