

Сила на масло-то. Лаксативно, и учинително.

Употрѣбленіе. На конституційж, и на боликоболѣніе.

48 видове Ричина има отъ кон-то най-добри е кротонъ Тимонъ, отъ нежъ една капка учинава вѣсма добръ вътрѣшности-ты.

{ Канѣла, Бзл. *Kardioron euddees*, Бзл. *Kardella*, Пр.
Лаврѣзъ кинамбумъ, Лат. Лаврѣзъ канеліеръ, Фр.
Канѣла рѣгѣл, Ит. Дарчинъ агачъ, Твр.

Класъ 6. Шестомѣжно. Чинъ 1. Саможенно.

Вижь фнг. 89 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1127. Канѣла-та е едно дрьво благобонно и многоживно; кое-то никне въ Киланскій островъ, въ Антилы-ты и въ Суматрѣ; стѣбло-то на канѣла-та е напѣто (хубаво), дебѣло единъ и половина кракъ, высоко 18 до 20 крака, вътрѣшна-та му кора е червѣникава, клонове ти му сж цилиндрически, листовѣ-ти имъ сж айцовидни, инволави зелени съ краскъ вѣдѣжъ и възвѣжъ, приличатъ на Лафижы-ты листы, цѣтѣ-ти имъ сж малки и възвѣли отъ-вънтрѣ, напѣти; въ основж-тж на канѣлах-тж сж рожда една дръва айцовидна и червѣникава.

Употрѣбляватъ въ медицинж-тж и икономіж-тж вътрѣшни-ты корни на канѣла-то дрьво, и масло-то изъ; най-добри ти корни на канѣлах-тж сж тѣхнѣ-ти, кон-то нѣхтж краскъ жальтиннакъ, въхъ ароматенъ, нагадителенъ, въждателенъ и сладчизъ.

Сила на коры-ты. Въждателни и върѣнтелни.

Употрѣбленіе. На болѣсты немощны и припаданіе, и истеризмъ.

Дозъ на прахъ-тж. По зр. 10 до 1 др. въ водж вѣрѣжъ др. 100. Масло-то сж даба по 1 канѣ до 2 и и 3 съ захаръ и водж.

Три видове канѣла има.

{ Вонѣва, Бзл. *Kilda kai akhlyon*, Бзл. *Kexrida ayra*, Пр.
Урднка діскіамъ, Лат. Гранъ урднкъ, Фр.
Уртнка гранде, Ит. Идургіанъ ѿтѣ, Твр.

Класъ 2. Двodomно. Чинъ 1. Четверомѣжно.

Вижь фнг. 90 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1128. Това растѣніе сж назвало по Старо-Гръцки *Achalops*