

С н а л а. Уирипителна, андементическа и мало стипитическа.

Употребленіе. На дисентеріи, хроническы діарей, менорагіи, бланниды и бланбаніе.

Доза. По 10 зр. до 30 на 24 часове съ захарь.

{ Балсамо на копанка, Бл. *Колатферор*, Бл. *Валсаиор*, Пр.
Копайфера Офичиналисз, Лат. *Копайфера Офисіалз*, Фр.
Балсамо ди копанка, Ит. Пелесингз агачи, Тър.

Классъ 10. Декатомжно. Чинъ 1. Саможенно.

Вижьдъ фиг. 96 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1132. Това растѣніе е едно дръво красно и весьма потрѣбно кое-то нѣкъ въ Индіѣ въ Бразилско то царство; стебло-то на дръво-то копанка е червеноорынкаво, листовѣ-ти мѹ съ айцоконіевидни; цвѣтовѣ-ти съ крыласти, съ тры, или чѣтыры чѣты на листовѣ-ты и вѣли, лѣжащи гроздообразно, кѣмъ врѣхове-ты на клоновѣ-ты и елиптически; плодове-ти мѹ съ едни рокове. Употреблява сѹ въ медицинѣ-тѣ рининаный-тѣ мѹ сокъ, кой-то сѹ продава подъ названіе балсамо на копанка; това балсамо е прозрачно, нама едно уханіе наладително, краскѣ възвѣж или жьлтеникѣж, въ-пѣ-тѣ мѹ е убеждателенъ.

С н а л а. Укождателно, дѣритическо и учипително.

Употребленіе. На раны врѣхъ дѣтородны ты удове, на левкорей-тѣ, из гонорей и французскы болѣсты.

{ Коралъ, Бл. *Кораллор*, Бл. *Левѣѣхортор*, Ир.
Коралѹмъ рѣврѹмъ Лат. *Коралина ди коринка*, Ит.
Мерджанъ и влиджанъ отъ. Тър.

Классъ, Чрьви, Чинъ живораствѣніа.

Вижьдъ фиг. 97 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1133. Корали-ти (мерджани-ти) сѹ едно хѣваво и изрядно произведеніе на море-то, тѣ не сѹ друго, освѣнь гнѣзда на нѣкъкон безчисленны и весьма малыы живинкы морскы, отъ родъ-тѣ на полиподы-ты; това гнѣздо е отъ итѣство-то на морикый-тѣ варовъ мѣрмаръ; тѣа полипи сѹ уживляватъ и сѹ умножаватъ въ остро-вѣ-тѣ Коринкѣ у Средиземно-то море, въ Атлантичскый-тѣ океанъ, и особито въ Чрьвено-то море, гдѣ-то сѹ изображаватъ различни корали, околъ островъ Коринкѣ и Кѹдиръ, растѣтѣ каменны кора-