

Употрѣбленіе. Отъ вѣтвѣ, на скиры ты, и скрефолны утичаша, на свинины (*хелѡга*), на раки канцерогамы, и на разны утичаша.

Доза. По зрна 5 или 10 отъ листы-ты, и той зи доз може да са умножи до 2 драмубе.

Пять видове чикута са намира.

{ Исландскій лихенъ, Бл. *Лѣхуръ Исландикусъ* Бл.
Морохлюор, Пр. Лихенъ Исландикусъ, Лат.
 Лихенъ Исландикусъ; Фр. Мѡско Есландико, Н. Чіѣръ Ѡтъ, Т.

Классъ 24. Тайноженидба. Чинъ 3. Лихенъ.

Вижьдъ фиг. 111 въ 2-ий Т. на рѣч. Бот.

§. 1142. Тоа лихенъ е растѣніе многоживно, кое-то са нахожда множественно въ планины ты у Европъ, и най-паче въ островъ-тъ Исландіѣхъ, никне отъ горѣ на земь-тѣхъ въ мѣста пѣсты и стрѣмны и по дръва та, клонасти-ти вѣгови пролаженіа еж малко прави, или високи до 2 или 3 прысты, тѣа клонове еж цыпави, еж краскѣ чрвеночръннѣавѣхъ, анисини, и нацѣпени край врѣхъ-тѣхъ. Употрѣблѣватъ въ медицинѣхъ тѣхъ вѣнчко-то растѣніе, кое-то има вѣхъхъ горчѣхъ; стиптичѣхъ и сполѣхъ.

Сила. То е питателно по убезсилѣвателно.

Употрѣбленіе. На маразмъ тѣленъ, на крѣвочухоткѣхъ, на чухоткѣхъ лекобѣхъ, и на кашанцѣхъ хроничѣхъ.

Доза. По др. 4 въ водѣхъ врѣлѣхъ, или малѣко др. 150 доклѣ да остане др. 100 за да стабе декото.

156 видове лихенъ са нахожда.

{ Бѣла лѡза, Бл. *Лѣухарпелосъ*, Бл.
 Врѡбнѣа ѡлкамъ, Лат. Винъ кланъ, Фр.
 Чѣка Салѣатнка, Ит. Енѣхъ ѡмѣа ѡгачѣ, Тѣр.

Классъ 22. Самодомно. Чинъ 8. Многобратно.

Вижьдъ фиг. 112 въ 2-ий Том. из рѣч. Бот.

§. 1143. Това красно растѣніе е многоживно, никне въ разны страны на свѣта, възистнижъ въ мѣста стрѣмны и лѣинаны (наторены) въ Гръціѣхъ, гдѣ-то цвѣти сколо Маіа мѣлацъ; корень-тѣхъ на това растѣніе е дебелъ, мѣенатъ, вѣлохлѣтъ, той има вѣхъхъ трѣхъхъ и горчѣхъ; отрасли-ти мѣ еж травдини, вѣлати ѣ дазги до