

рѣзатъ за такива чародѣйны средства. Корин-ти на мандагорж-тж сж вѣтеновдини, кон-то прилчатъ на човѣшкы клажы, стѣ-кло не ила мандрагора-та, сѣвѣнь много листове, дзгн, вѣлиѣ-ши, айцоконѣвдини, тѣмнозѣлини, сж иѣкон космы, кон-то цвѣтатъ край есень-тж; лѣтѣ мандрагора-та посхнѣва и не сж вижда; пло-дове-ти и сж гроздове иѣкон възжальти, отъ кон-то жога-то адѣтѣ дѣца-та отраватъ и умирайтъ.

Сила. Наркотически, стиптически на раны-ты и унѣщителины.

Употребленіе. На утичаніѣ терды (и раны на крофѣ-лы-ты, на сирингъ-тж (фистула-тж), и на иѣкон колѣніѣ.

{ Копаръ, Бл. *Māraθpor*, Бл. *Mālaθpor*, Пр.
 { Инѣлих финѣулау, Лат. Финѣула Комѣни, Фр.
 { Финѣио, Ит. Ресѣио отъ, Тѣр.

Классъ 5. Наторажно. Чинъ 2. Дѣженно.

Видъ фиг. 117 въ 2-ой Т. на рѣч. Бот.

Ф. 1148. Копаръ-тж сж одно растѣніе многогодишное, никне въ в-вронж и въ Блзгарѣж вѣсма много, гдѣ-то цвѣти около Іюліѣ лѣтѣсѣцъ, травлин-ти мѣстѣла сж многослѣтени, высоки до 3 или 4 крака; клонове-ти нѣмъ сж тѣжкы, листове-ти пакъ тѣлини, дрѣвини, и трикрылини, въ вѣрхъ-тж на клонове-ты много-то тѣлини цвѣтове сж въ видѣ корнѣвѣ, или зонтикѣ (омѣрѣж), жалтинѣкави; плодове-ти нѣмъ сж сѣмена иѣкон дрѣвини като пшеницж-тж, то-пли и възгорчиви, вѣжко-то растѣніе сж употреблѣва вѣсма въ домыстронѣлство-то.

Сила. Укрѣпительно и разрѣшительно.

Употребленіе. На възпламенителины кѣлины, на непѣшева-реніѣ, и слаксѣжъ желѣдочниж и чрѣвиж; отъ вѣнж разрѣшена-та нѣмъ вода на слѣзотѣжѣшы очы.

Досъ на плодове-ты. Въ декото во др. 3 до 5 въ во-дж вѣрѣж др. 100.

Много видове копаръ сж нахожда.

{ Дрѣво на мѣниж-тж, Бл. *Melica parviflora*, Бл.
 { *Melior tēs parvas*, Пр. Франѣнѣж, Лат. Фрѣнѣж амѣниж Фр.
 { Ялѣво дела мѣниѣ, Ит. Кудрѣтѣ агачи, Тѣр.

Классъ 25. Многоженіе. Чинъ 2. Саможѣшю.

Видъ фиг. 118 въ 2-ой Т. на рѣч. Бот.