

Видъ фиг. 124 въ 2 ѡй Т. на рѣч. Бот.

§. 1152. Тоа камбулашъ са называва вытолстениъ, зашто-то листове ти мѹ сж комахай быти (валчегти); корень-тъ мѹ е врьте-новиденъ из ифкон дръвны коренче-та; отратан-ти мѹ сж травани и много, чръвеникави, клонове-ти нмъ сж малки, листове-ти мѹ лѣжатъ отдѣлно из голѣмы кослаа, тѣи сж срѣдцособразни из мно-го нервы, чисто зѣлени, или инѣлави.

Цвѣтове ти на камбулашъ-тъ сж отборени, вѣан, и на врьхъ-тъ чръвени, кой-то цвѣтатъ около Юлѣа августъ и Септемврѣа, упо-треблаватса листове-ти въ медицинѣ-тъ и хозайство-то вима много.

С и л а на л и с т о в е т ы. Умагкчителни и движителни на у-тробъ-тъ.

У п о т р ѣ б л е н і е. На кашлицъ, на старангурѣжъ, на консти-паційж, на флгмионы, на заболѣлы еморонды (межежлъ), и на ра-зны страданѣа.

Д о с ы. Волко-то достига.

49 видове е камбулашъ-тъ.

Миризанвѣх орѣхъ, Бзл. *Moschocardia*, Вл. и Пр.  
 Миристикъ моухата, Лат. *Muskadiéra* ароматикъ, Фр.  
 Ноче моухата, Ит. Хиндистанъ дживизи, Тър.

Классъ 20. Двѣхщно. Чинъ 8. Самобратни.

Видъ фиг. 126. въ 2 ѡй Т. на рѣч. Бот.

§. 1153. Миризанвѣхъ орѣхъ е едно дръво многоживно, кое-то никне въ Мѹлавики ты островы Бандж и Борбойж, отъ гдѣ-то дохожда намъ Миризанвѣхъ орѣхъ; стебло-то мѹ са въз-вышавла до 30 крака, не едно отъ прѣкрасны-ты дребеса на свѣтъ-тъ; стебло-то мѹ е из много клонове.

Кора-та на стебло-то е чръвеночръвеникава, листове-ти нмъ сж дла-говати, цѣан, хубавозѣлени отъ горѣ, и въззѣлени отъ долѣ; цвѣтове-ти нмъ сж малки, жльтенникъви, и изображаватъ малкы и многы коримвы; плодове-ти нмъ сж единъ гроздъ дриповиденъ, почти сферическъ, чръвеножълтъ, кой-то са нарыча просто макаеъ, Търски Песпасе, отъ вѣтрѣ нмъ е миризанвѣхъ орѣхъ, то етъ плодъ-тъ, сферическъ и на разнъ кракъж, равниъ из единъ голѣмъ лѣщникъ.

С и л а. Укрѣпителенъ и убождателенъ.