

мж, или хубаво шарениж; плодове ти на цвѣтоте-ты сж положени въ
мѣстѣ, пазни из дръвены и чрвннковы сѣмена.

Сила. Убождателенъ и тониченъ.

Употребленіе. На многорзніе чрѣзъ кадѣніе-то на трѣвж-
тж (пипа, чубѣж), става и кистирь (фокж, интканъ Тѣр.) и
като катапаазма (лапа) врѣхъ ѹтичаніа стѣдены и на анасарка.

Досъ на листоте-ты. По полз др. до 1 въ водж врѣ-
лж др. 100 за да стане канзакъ.

9 видове е растѣніе-то на табакъ-тж.

{ Свато дръво, Бзл. *Euláurior*, Бл. *Amorolol*, Пр.
Гѣакъмъз Ѳфицинализ, Лат. Гѣакъ Ѳфициналъ, Фр.
Леніо сѣнто, Ит. Піамбѣрз агачи, Тѣр.

Илаиз 10. Дѣлтомжжно. Чинъ 1. Саможенно.

Вижьдъ фиг. 135 въ 2-ый Т. на рѣч. Бот.

§. 1159. Това свато дръво е многоживно, кое-то никне всѣ-
ма много по островы-ты ѹ Америкъ въ Антилы-ты (острове),
Ямаикъ, Санъ Доменико, гдѣ-то цвѣти околъ Априлж мѣсѣцъ.
То сж възвѣшавъ доста; стѣло-то мж е агко, и по тѣжко отъ
дрѹгы-ты дръва, е ричинано из красж жьлточрвннжъж, въсѣз и
ма горчнжъ, трѣлжъ и ароматнжъ, листоте-ти мж сж противѣдѣжаци-
и сложени отъ пять или шесть листовцы, зѣлены; цвѣтоте-ти на
това растѣніе сж като зонтици, или вѣзан, тѣн имѣтж красж
синжъ и хубавж и малко влзати; плодъ-тж мж е една половинца (*θήκη*)
мѣстната, коа-то има красж чрвеножълтъж, ѹпотѣблѣва сж въ мѣди-
цинжъ-тж и икономіжъ-тж дръво-то и ричина та; таж ричина сж зове
тома гѣакъ, коа-то сж дава сж захаръ и жьлтнжъ тж отъ айце.

Сила. Укрѣпитена на лѹмфатическы ты сждини, дѣврнтически
и противовенерически.

Употребленіе. На венерическы колѣсты, на хроническы
резнатизмы и на страданіа на кожъ-тж.

Досъ. На дръво то въ прахъ едръ др. 8 въ водж врѣлж др.
200 за да остане половина-та.

Ричина-та по зр. 10 до 20.

{ Трѣланѣ оконоида, Бзл. *Orois achanthoides*, Бл.
Онониъз спнлѣзамъ, Лат. Вѣгранъ діо кампанъ, Фр.
нокиде вѣлмиаколи, Ит. Шаканъ каранъ, Тѣр.