

Класиз 17. Дивуратин. Чинз 4. Дивуратин
Вижьдъ фиг. 136 въ 2-ый Т. на рѣч. Бот.

§. 1160. Таа трънлива-та ошонда, наречаса така зашто магарета та ѿ маджта много (ѿ ос. Бл. магаре значи); та никне въ неосработаны мѣста и стрѣины у Европж, гдѣ-то цѣти [край Инліа мѣстацз; корени ти на това растѣніе сж дръвастн, отрасл-ти нмз ракин, голшши, и дръвастн, багастн из много клоиче-та, кон-то из многоврѣліе-то наврѣліи ставатъ трънливи, за това и трънлива сѧ нарѣча таа трава бичка; трънѣ-ти сж бато иган тзики остри и дѣки; листовѣ-ти лѣжатъ отдѣлно; цѣтскѣ-ти нмз излазатъ отъ жѣлы тѧ на клонове-ты, изъ краскж чрвѣнж, или порфирнж, или и изъ жѣлы цѣтскѣ, изъ тѧ е Натрѣкж на-звѣ-ма ошонда. Употрѣблаватѧ въ медицинж-мж корени-ти ѿ на прахъ, или въ декотѣ.

С и л а. Укѣзпавателни на анафатическы-ты сждины.

Употрѣбленіе. На жѣтнинцж-тж, на ѹтичѣліа на до-нижъ тж ѹтробж, на епидидимж-тж на мадѣ-ты, на охитѣж бѣ-лодрѣнж, на чекѹрѣж пронѣхождана отъ камини, на сѣрковилы на мадѣ-ты.

Дозъ. На прахъ по др. полъ до 2 др. 4 въ водж врѣлж др. 100 за да стане декотѣ.

20 видове ошонда сѧ нахожда.

{	Висѣлокж, Бл.	<i>Ocellis</i> , Бл.	<i>Euro. lapaor</i> , Пр.
	Рѣмекж ѡчетозѣламиз, Лат.	Опѣлз Ѣрднѣ, Фр.	
	Ѥчетозѣла, Ит.	КѢн Ѣлѣнж, ТѢр.	

Класиз 6. Шистомажно. Чинз 3. Трибенно.

Вижьдъ фиг. 157 въ 2-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1161. Кисѣлокж-тж е едно растѣніе годишно, корени-ти мѢ сж многожнви, това растѣніе е отъ родж тж на дивы-ты апа-децы, но е кисѣло, за това и кисѣлокж сѧ назоказѧ; корени-ти мѢ сж дѣкли и чрвѣнѣкви никне дивж по стрѣины мѣста. Той сѧ нахожда и въ Бѣлгаріѣж.

Въ Европж сѧ окрѣотва въ градины-ты за домашнж ѣкономѣж на житѣлы-ты; отрасл-ти на това растѣніе сж трагѣни, тзики, высоки до 1 кракж, листовѣ-ти нмз сж дѣлговати, копѣвѣднѣ; цѣтѣ-