

У Азий и Европе и въ Балгарии, конъ-то изъ обработаніе-то до-
стигватъ питомый и гладостин въ Аденіе, и въ покартико-то въсма
употребителіи.

Корени-ти на кервізъ съ десенъ изъ много коренче-та; тѣи
имѣтъ едно уханіе ароматно-и наладитено. Вкусъ-ти имъ є ваз-
горчицъ; отъ тыль корены порастаютъ много стебла трава-ти,
праздни отъ вилкѣ, листове-ти имѣніи-ти изъ криловиднѣ и дко-
викли въ видѣ папарь, приличатъ изъ листовы-ты на Ангелик-
тж., Императорск-тж и Ираклиевск-тж трава, цѣлѣстове-ти имъ
мѣжатъ по вѣрхове-ты на клонове-ты, въ видѣ зонтицы отворе-
ны, малы изъ пять пальца възбѣлы, наи вѣложильты; употреб-
ляются въ медицинск-тж и экономійск-тж.

Сила на листове-ты. Употребленіи дѣрнитически и
гладостин.

Употребление. На идропион-ты, колики и туберкулезъ-а.

Доза на сѣмена-та, и на прахъ. По зъна 24 до 1
дф. Отъ тѣхъ имъ и днѣи много.

10 видове кервізъ съ находда.

{ Синаминъ, Бл. *Serrula cassia*, Бл. *Sygraria*, Пр.
Касія сена, Лат. *Cenx* д' Италіи, Фр.
Сена, Ит. Синаминъ, Т8р.

Видъ 10. Десатомажко. Числ 1. Саможенно.

Виждь фиг. 156-ва 2-ий Т. на фѣч. Бот.

§. 1178. Синаминъ-то є едно растѣніе годишнѣо, ѿе то прои-
ходи изъ Египета, сїща-та сена сїкася вълкѣ годинѣ и въ Ита-
лии, и є подобна изъ Египетско-то Синаминъ въ мѣсто тепло о-
воща Мартъ мѣсяцъ, послѣ сї присажда въ мѣсто отворено, и сї
приглаждва; отрасли-ти на Синаминъ-то сї трава-ти, тканы, въз-
вышаватса до 1 и полѣ кракъ. Листове-ти ^{мѣс} сї по дѣлъ или
три четы (четы), почти яйцобиднѣ, тѣи сї зѣланы, вѣсма
ткани, коммати, цѣлѣстове-ти имъ инкія на гроздове, и сї жи-
тникави; плодъ-ти имъ є единъ роговъ съдрѣжъ яйцобиднѣ; у-
потребляется въ медицинск-тж листове-ти на Синаминъ то, конъ-
то имѣтъ едно уханіе благопрѣятно, вкусъ горчицъ и досаденъ.

Сила на листове-ты. Уничтоженіи и услабителии.

Употребление. На конституцію на тѣла-та.