

Классъ 5. Патомажно.

Чинъ 1. Сажоженно.

Видъ фиг. мѹ въ Одеръ 664.

§. 1187. Тока многоженно растѣніе инкне въ мѣста остѣнены и влажны у Грьцїѣ, корени-ти мѹ еж дебелы, до 1 прьстѣ, цнани-дрнческы, отрасли-ти нмѣ еж травасты, и клонасты высоки до 1 ногѣ, листове-ти нмѣ еж длази и широки, дебелы, граваби, вла-сати и айцокопїевидны, цвѣтове-ти нмѣ еж жалтынкы, употрѣ-бляеатѣ въ медицинѣ-тѣ корены ты нмѣ.

Сила. Умагкителны, питателны и стиптически.

Употрѣбленіе. На странгѹрїѣ, нефритѣ, и на искланїе-то на человекѣ-ты, и възити на дѣца-та.

Дозѣ на корены-ты. По др. 8 въ водѣ врѣѣ др. 100 става и кофїоне стиптическо.

{	Хамедрїо, Бл. и Простогр.	Τεύχριον χαμαίδριον, Бл.
	Тевкрѹмъ хамедрїсѣ, Лат.	Жермандре Ѡфисиналѣ, Фр.
	Брѣка кѹерцїола, Ит.	Кисѣ махмѹдіѣ, Тѹр.

Классъ 14. Двоинаіе.

Чинъ 1. Голоосеменко.

Видъ фиг. 182. въ 2-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1188. Тока малко растѣніе е многоженно, инкне въ разны страны на Европѣ, Азіѣ и Грьцїѣ, гдѣ-то цвѣти крѣй Іюніѣ мѣсѣцѣ и Іюліѣ; тока хамедрїо казвасѣ простогрѣцкѣ сѣѣ τῆς Παγαυίας τὸ δάκρυον (слѣза Котородична) и χόρτον τῶν ἐξωχάδων (травѣ на маѣсѣлѣ-тѣ) и Λαυωχοιμειθέα, (спавѣло зрѣшко).

Корени-ти на хамедрїо то еж пѣзителны, отрасли-ти нмѣ тра-васты листоносны и властны; листове-ти нмѣ еж властны, възлѣзѹщи и раздѣлени кѣто на дѣвѣ-тѣ, малы и зѣленокрасовиты; цвѣто-ве-ти нмѣ нѣхождѣтѣ най вече три по три порфїрны (чрѣвны); вѣнка-та травѣ употрѣбляеасѣ въ лѣкарство-то, коѣ-то нмѣ ѹха-нїе ароматно, вкѹсѣ горчнкѣ, горѣща и ароматенѣ.

Сила. Укрѣпително.

Употрѣбленїе. На хлорозисѣ, на хроническѣ ардритѣ на-вѣнкашны и вѣжтрѣшны еморонды, и прочїи еморагїи (крѣвотеченїе).

Дозѣ. По др. два въ водѣ врѣѣ др. 100.

57 видове хамедрїо сѣ налази.