

анзатя изъ стомахъ-тъ въ чрева-та, огвѣнь по погрѣшиность и отъ искон болѣты.

§. 35. Слѣдовательно гаѣдз Желудка-тъ слѣдоватъ Чрева-та. Тіи сж почти 6 пяды по длиги отъ роста-тъ (*агастра*) на человѣческо-то тѣло. Чрева-та винчики-ти сж цинандрически и макки. Тіи са раздѣлыватъ на чрева тики и чрева дебели. И тики-ти са раздѣлыватъ на трь; сирѣчь: на Дванадесѧтьстно ТУ. фиг. 4. Постникъ, кое то по-вѣчѣ-то е праздно, и на Июнъ XXXX, въ кое-то са гаѣчава Илїачека-та называема болѣсть. А дебели-ти чрева са раздѣлыватъ и тіи на трь, сирѣчь; на Сѣпть по У. Кое-то были като една опашка, на Гжэх Шиш, въ кое-то са гаѣчава колика тъ (санджи то) и на начально а, кое-то е край-тъ на Гжэх-тъ, или что са казба дробіолче Афедронъ.

### СРѢДОЧРЕВІЕ.

§. 34 Срѣдоочреве-то е една часть на Перитонео-то, винчика-та мембрана (ципака). То са находжа почти въ срѣдл-тѣ на чрева-та ГГГ. фиг. 5. То гврьзва и дрѣжи полемѣждъ имѣ твердо тѣмъ чрева, и Мѣконосны-ты и Хилоносны сждини Г; брѣхъ же-лудка-тъ К, и чрева-та ДДД, лѣжалъ называеми-ти Биплон, голѣмо и малко. Тіи сж една покрышка тики отъ таистниж, коа-то покрыка же-лудка-тъ и чрева-та, кон-то дрѣжатъ топлы и хлѣ-згзы тѣхъ. Когда-то тіа покрышки са разкладватъ (татѣнатъ) отъ болѣты, тогава же-лудка-тъ, или чрева-та сж стѣдени, за ради това тѣка страдатель-тъ да иси отъ горѣ имѣ дрѣхъ иан кожухъ кога-то температурата (брѣма-то) е стѣдено.

### ПЕРИТОНИО.

§. 35. Около гврьза на чрева-та Д, на стомахъ-тъ В, и на Биплон-ты, на Печенкѣ-тѣ ВФ и Сльзинѣ-тѣ ФФ, и на Пан-кreasѣ-тѣ ИИ. фиг. 5. находдася една снача мембрана ППП. Перитонийна Цыпа нарыцаема. Та са жи за да дрѣжи что сж въ не-иж винкѣности-ты въ сжшо то мѣсто и за да забранява тѣхно-заплѣблваніе и сведеніе.

### ДЕКА (Бѣла дроби).

§. 36. Въ честа-та на человѣка-тъ близо при Фаринкѣ-тѣ, на-