

цѣна на камбіо-то, за кое-то трѣбва да поставява съразмѣрно-то умноженіе.

Ето два примѣри за по-ясно доразумѣніе:

П р и м ѣ р з П р в ы й. Единъ трговецъ у Цариградъ получава заповѣдь да тегли сръшо Вѣннъ камбіо по 440 пары за единъ флоринъ, и да внесе количество-то на това камбіо въ Марсилъ по 172 пары за единъ франкъ. Кога-то получи тѣхъ заповѣдь Цариградскій трговецъ не може да тегли сръшо Вѣннъ, оскѣнъ по 455 пары за единъ флоринъ, и слѣдователно иска да знае съ коѣ цѣнъ трѣбва да сполучи камбіо-то за Марсилъ за да съгласи загубъ-тъ отъ тегленіе-то (тратъ-тъ). Работа-та е убо да наиде съразмѣрно-то по-долне оцѣненіе на Марсилско-то камбіо, и слѣдователно прави слѣднѣхъ-тъ аналогыхъ:

$$440 \text{ пары} : 455 : : 172 : X \text{ отговоръ} = 168,45.$$

Не трѣбва убо да извърши поръчаніе-то, кое-то бѣ сполучилъ, оскѣнъ кога-то сполучи камбіо за Марсилъ по 168,45 пары.

П р и м ѣ р з в т о р ы й. Единъ трговецъ у Цариградъ получава заповѣдь да внесе въ Лондонъ по 110 гроша за единъ лиръ Англійскъ, и да тегли за Вѣннъ по 440 пары за единъ флоринъ; въ минутъ-тъ, въ коѣ-то получи това поръчаніе камбіо за Лондонъ е по Гр. 111, иска убо да са извѣсти то съ коѣ цѣнъ трѣбва да тегли въ Вѣннъ за да съгласи загубъ-тъ отъ испраханіе-то; рѣшеніе-то на това пытаніе ще го получи съ слѣднѣхъ-тъ аналогыхъ 111 Гр. : 110 : : 440 : X отговоръ = 456,4.

Много пѣти обаче банкыерскы-ти тѣа поръчаніа съ по-общы и издръжавать по-големо число отъ купила. Таковыя поръчаніа наричатся *сложни* (*сύνθετοι*), и съ тѣхъ са поръчва корреспонденту да тегли или да внесе въ различни мѣсти спорадъ опрѣдѣленны цѣны, съ свобода да избере онова купило, кое-то показва по-малко загуба, или онова купило, кое-то показва по-големъ печалъ въ случаѣ, въ кой-то кога-то полу-