

цїна и камбіо-то, за кое-то трїбва да послїдава съразмѣрно-то умноженіе.

Ето два примѣри за по-ясно доразумѣніе:

Примѣръ П р в ы й. Единъ трговецъ у Цариградъ получава заповѣдь да тегли срѣщо Вїеннѣ камбіо по 440 пары за единъ фїоринъ, и да внесе количество-то на тока камбіо въ Марсилѣ по 172 пары за единъ франкъ. Кога-то получи тѣхъ заповѣдь Цариградскій трговецъ не може да тегли срѣщо Вїеннѣ, освѣнъ по 455 пары за единъ фїоринъ, и слѣдователно ника да знае из коѣ цѣнѣ трїбва да сполучи камбіо-то за Марсилѣ за да спазе загубѣ-тъ отъ тегленіе-то (тратѣ-тъ). Работата-та е убо да наиде съразмѣрно-то по-долне оцѣненіе на Марсилско-то камбіо, и слѣдователно прави слѣднѣхъ-тъ аналогыѣ:

$$440 \text{ пары} : 455 : : 172 : X \text{ отговоръ} = 168,45.$$

Не трїбва убо да извърши порѣчаніе-то, кое-то вѣ получилъ, освѣнъ юга-то сполучи камбіо за Марсилѣ по 168,45 пары.

Примѣръ в т о р ы й. Единъ трговецъ у Цариградъ получава заповѣдь да внесе въ Лондонъ по 110 гроша за единъ лирѣ Англійскѣ, и да тегли за Вїеннѣ по 440 пары за единъ фїоринъ; въ минутѣ-тъ, въ коѣ-то получи това порѣчаніе камбіо за Лондонъ е по Гр. 111, ника убо да са извѣсти то из коѣ цѣнѣ трїбва да тегли въ Вїеннѣ за да спазе загубѣ-тъ отъ исправаніе-то; рѣшеніе-то на тока пытаніе ще го получи из слѣднѣхъ-тъ аналогыѣ $111 \text{ Гр.} : 110 : : 440 : X \text{ отговоръ} = 436,4.$

Много пжти обаче банкьерскы-ти тїа порѣчанїа сѣ по-обыч и издръжавать по-голѣмо число отъ купила. Такыѣ порѣчанїа наричатъ с л о ж н и (*сбѣзгои*), и из тѣхъ са порѣчка корре-спондентѣ да тегли или да внесе въ разлїчны мѣсти (спорадѣ о-прѣдѣленны цѣны, из свободѣ да избере онова купило, кое-то показва по малко загубѣ, или онова купило, кое-то показва по-голѣмѣ печалѣ въ случаѣ, въ кой-то кога-то полу-