

новж-тх смѣткх шжть бжджть лухвоноси само отх датж-тх на новж-тх смѣткх. Ва да извѣдимъ убо това неприличіе поспѣваме смѣдѣющж-тх методж. Нахаждаме колко сж лухвоноси-ти дни на тыхъ количества отх датж-тх на смѣткж-тх до лухвоносж-тх нмз датж, и забѣлѣваме число-то на тыхъ дни въ окыковинно-то нмз мѣсто на лухвонисла-та; нх за да различаваме тыхъ лухвонисла отх другы-ты числа (что-то сж отх друго значеніе, пишемъ гы сж чръвено мастило; исто-то правимъ за тыхъ лухвонисла и въ увѣрительнж-тх и въ задлжжнтелнж-тх стрлж на смѣткж-тх.

Отх колко-то казахме до нынѣ разумѣваме, че качество-то на чръвены-ты лухвонисла е извѣстнз друго отх чръны-ты лухвонисла; и наистинж тѣа поспѣдн-ти показвать че лухва-та трѣбва да сѧ приложи на количество-то на смѣткж-тх, а чръвени-ти лухвонисла напротивъ показвать че лухва-та трѣбва да сѧ извади. Ва да получимъ това ето что правимъ кога-то сканчаеме смѣткж-тх. За уравненіе на капиталы-ты и на чръны-ты лухвонисла не имаме да кажемъ нѣчто, зачто-то това уравненіе сѧ правн какъ-то въ другы смѣткы, нх за чръвены-ты лухвонисла правимъ така: нахаждаме уравненіе-то на задлжжн-телны и на увѣрительны-ты чръвены числа, забѣлѣваме количе-ство-то на уравненіе-то въ прилично-то мѣсто а като найдемъ спорадз познатж-тх методж количество-то на лухвж-тх коѣ-то има уравненіе-то записваме това количество лухвено въ колонж-тх на капиталы-ты.

Ако уравненіе-то на чръвены-ты лухвонисла е задлжжнтелно, записваме количество-то на лухвж-тх что излѣзе отх уравне-ніе-то въ увѣрительнж-тх колонж на капиталы-ты, ако ли ура-веніе-то е увѣрительно задлжжаваме смѣткж-тх въ колонж-тх на капиталы-ты сж лухвено-то количество.

И можемъ за по голѣмж краткость вѣксто да найдемъ ли-