

земи напрѣднинѣ върху горнята пролѣтъ. Мы видѣхме, че съядбыты прѣзъ есенъ сѣ едно благополучно употребеніе отъ това забѣлѣжваніе. Нека прибавимъ, че безрѣчната добывка, въ многото обстоятелства, на направеныты прѣсажданія отъ рано, има еи друго нѣ по-малко важно слѣдствие.

Прѣзъ *едно голѣмо лѣто*, хытрый земледѣлецъ нахожда срѣдства да умножи своето иманіе съ кѣсны жѣтвы. — За другостранныты растенія има врѣмя да ся расцавтѣять и да имъ озрѣять плодовети. — Климатити, най-послѣ, вижда ся, да напрѣднувать кѣмъ полунощъ, кога *голѣмыты зимы* гы правять да ся поврщать кѣмъ пладнѣ.

Освѣнь това, траяніето на една умѣрена студъ не ся вижда да има другъ лошетія токо да укжснява успѣха на изникнуваніето; зачто състояніето на бездѣйствието въ което тя садържа органыты на растеніята отъ наша климатъ, сѣще и кога ся продължава отвѣждъ обыкновеното врѣмя, не измѣнява чувствително тѣхныты съхранителны свойства. А. Туйнѣ приказва, върху това нѣчто, едно любопытно дѣло, за което людіети, виждася, не сѣ доста размыслили слѣдствіята. — Тойзъ ученъ земледѣлецъ бѣше испратилъ въ Руссія нѣколко растенія, между които имаше единъ врзопъ овошкы, който падна въ една ледарница, дѣто остана забравенъ двадесять и единъ мѣсяць. — Слѣдъ едно толкосъ голѣмо зимуваніе, и въ такывы обстоятелства чловѣкъ можяше повѣрва, че всечко е исъхнало. — То пакъ быде друго-яче. Г. Демидовъ, комуто тыя бѣха проводены, като съгледа, че направата имъ не приличяше да ся е измѣнила, наряди да гы посадыть съ голѣма грыжа. — Всичкыты ся хванаха, нито едно не исъхна.

§ III. — Голѣмина на горящината и на студъ-та.

Ако и *срѣдната температура* на всякой климатъ не ся промѣнява толкосъ колкото нѣкой можяше го вѣрва, не е по-малко истинно, че голѣмината на горящината и на студъ-та е далеко да бѣде всяка година сѣщата. — Въ Паризъ, термометръ-тъ е възлѣзаль до 30° (38° сентиграда) прѣзъ Іулія, 1739 л. — Той е слѣзаль до -19° ($23^{\circ} \frac{1}{2}$ сент.) подъ 0° прѣзъ Януарія, 1795 л. И при това, прѣзъ обыкновены години, горящныты на лѣтото не ся издвигать надъ 20 до 26° (25° до 31 сент.), и студовети сѣ рѣдко повыше отъ -6 до 12° ($7\frac{1}{2}$ до 15 сентиграда).

Едвамъ е потребно да прибавимъ, че студовети ся умножавать или смалявять на голѣмина въ противенъ рядъ на горящныты, спорядъ колкото напрѣднува чловѣкъ отъ точката, что забѣлѣжихме, кѣмъ полунощъ или кѣмъ пладнѣ.

Голѣмината на горящината може, въ нѣкои обстоятелства, да измѣнява своето траяніе. Линне, и, отъ негово врѣмя, мнзина естестваре сѣ съгледали что, за да достигне въ съвършено плодоносіе, всяко растеніе има нуждъ отъ особено количество