

8. Госавски теренъ има тукъ-тамъ въ Турция, въ източна Сърбия и пр.

9. Кредна система съ рудисти се намира въ доста големи маси по цѣла западна Турция и Македония. Той прибавя че Peters е наблюдавалъ капротиненъ варовикъ дори при Русе.

10. Мергелна креда съ белемнити има само въ западна България.

11. Карпатски и виенски пѣсъченъ Еоценъ или терциеренъ флишъ излиза въ западна България и пр. Но въ Турция има фукоидни пѣсъчници и отъ кредна система; по-големата част отъ тѣхъ обаче ще бѫдатъ еоценски.

12. Нумулитна система е развита около Варна и въ източна Тракия.

13. Миоценъ, или виенски неогенъ, се показва въ малкиятъ котловини по течението на Струма, на югъ отъ Родопите, въ големиятъ тракийски басейни, въ западна България (Тимошки басейнъ) и въобще въ терциерните котловини на тази страна, въ басейна на Осъмъ, на Г.-Камчия, при Ески-Джумая, Шуменъ и пр.

14. Ератични блокове не е констатиралъ Буе въ нашите страни.

15. Серпентини, диалагни и диоритни скали, както и зелени металоносни порфири, които проникватъ пѣсъчния Еоценъ, сѫ намѣрени въ Македония и пр.¹⁾

Когато презъ 1869 год. Ferg. v. Hochstetter предприе да изучава терените презъ които имаше да се строи желѣзнишката мрежа въ Евр. Турция, главно долините на Марица, Тунджа, Струма и Морава, Буе направи важни съобщения въ виенската академия за Хохщетеровите изследвания по нашите страни, както и за бѫдащето на желѣзниците линии въ Турция.²⁾ А следъ завръщането на Хохщетера,

¹⁾ A. Boué. — Exposé des raisons pour lesquelles j'ai modifié aujourd'hui une partie de mes classements géologiques de la Turquie en 1840. (Bull. Soc. Geol. de France. 1865, II ség., t. 22, p. 164—174). Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie etc. 1866, p. 857—858).

²⁾ A. Boué. — Über türkische Eisenbahnen und die Geologie der central Türkei. (Sitzungsber. d. k. k. Akad. der Wissenschaften in Wien. 1869, Bd. 60).