

къмъ Комарево, недалече Берковско-Фердинандското шосе. Тази варовита зона пресѣчена е отъ р. Огоста въ нейното горно течение.

Много въ по-голѣми цѣлини излиза този катъ на югъ отъ Комскитѣ и Петроханскитѣ височини. Една частъ отъ него преминава отъ Сърбия, близо с. Сѣнокость и се разширява на изтокъ отъ Царибродъ, като се направлява къмъ Искъра; последната се продължава и отъ дѣсната страна на тази рѣка къмъ с. Осеновлакъ.

Най-забележителни вирглорийски фосили въ Западнитѣ Балкани сж: *Entrochus (Encrinus) lilliiiformis* Lam., *Spiriferina Mentzeli* Dunker, *Retzia trigonella* v. Schloth., *Waldheimia vulgaris* v. Schloth., *Pecten discites* v. Schloth., *Lima striata* v. Schloth., *Gervillia mitiloides* v. Schloth., *Ostrea spondyloides* v. Schloth., *Modiola gibba* v. Alberti, *Arca triasina* Römer, *Myophoria elegans* Dunker и пр.

По-на изтокъ, сжщиятъ катъ се открива около с. Гложене и Тетевенъ, както и по височинитѣ на Троянския Б. Обаче отъ Габровския Балкаиъ къмъ изтокъ варовицитѣ и доломитнитѣ варовици изново съставляватъ по-компактни масиви, както и въ Западна България и съ малки прекъсвания се простиратъ и отъ дветѣ страни на Стара-планина дори до Сливенскитѣ височини. Въ тая частъ на нашето отечество отъ фосилитѣ могатъ да се споменатъ: *Encrinus lilliiiformis* Lam., *Encrinus dubius* Gldf., *Spiriferina Mentzeli* Dunk., *Pecten Albertii* Gldf., *Pecten discites* Schloth. sp. *Myophoria laevigata* Gldf., *Natica gregaria* v. Schloth. *Gyroporella annulata* Schaft sp. и други.

Въ по-малки партии вирглорийскитѣ варовици се явяватъ и на югъ отъ Балканската верига въ Сръдна и Сърнена-гора.

Още въ Западна България при село Голѣмо-Малово се отдѣля единъ малъкъ клонъ отъ сръдно-триасовитѣ варовици, който въ юго-западна посока по горнитѣ склонове на Балкана достига до с. Балша, върху севернитѣ поли на Софийската котловина. Само една незначителна ивица отъ тия варовици опасва отъ къмъ югъ една частъ отъ споменатата котловина между с. Симеоново (бивше Бейлеръ-Чифликъ и)