

Парамунската пл. и пр. Около южните и източните поли на Руй пл. Догерът е съмнителен.

Отъ споменатите локалитети най-типично се разкрива Догерската серия около ждрелото на р. Ерма, где се забелязват: варовити брекчи, оолитни варовици, сиво-пепеливи и тъмни, отчасти пъсъчни, глинени варовици, премеждени съ бълки калцитни жилчици, твърде богати на вкаменелости като: *Rhynchonella varians* Schloth. sp., *Rh. spinosa* Schloth. sp., *Terebratula perovalis* Sow. sp., *Terebratula maxillata* Sow., *Pecten demissus* Phill., *Gresslya uniooides* Römer sp., *Goniomya angulifera* Sow. sp., *Parkinsonia Parkinsoni* Sow., *Park. Garantianus* d'Orb., *Belemnites aff. giganteus* Schloth. sp и много други.

Около с. Петаченци, въ основата на пъсъчните варовици, излизат въ тънки и дебели банки още и сиво-пепеливи кварцити. Около последното село виждат се и варовици, които образуват високи стръмни стени, пресъчени отъ р. Ерма. Към с. Одоровци въ тия варовици съ намърени *Ostrea aff. Knori* Ziet. и *Ostrea (Gryphaea) Trnensis* Toula.

На изтокъ отъ Трънъ подъ Драговския върхъ въ шистозните синозърнести пъсъчници най-често се срещат *Pecten cfr. disciformis* Ziet. и *Anomia aff. nummismalis* отъ Долния Догеръ, а въ брекчастия варовикъ отъ същата старостъ *Pecten demissus* Glaf. и *P. textorius* Glaf.

Въ Парамунската пл. Средна Юра може да се наблюдава около Ездимирския манастиръ Св. Богородица, на западъ отъ с. Филиповци. Изподъ тъмно-пепеливите варовици и доломитните варовици отъ малмска възрастъ, които се простиратъ въ тънка ивица отъ съз. къмъ юн., следва варовите оолити съ *Pholadomya Murchisoni* Sow., а на по низъкъ хоризонтъ въ същия намъриха се *Terebratula perovalis* Sow. и други. Още по низко варовиците преминаватъ въ сиво-пепеливъ зърнестъ и мергеленъ варовикъ, въ който особено чести съ *Ostrea Knorri obscura* Quenst. Подъ тяхъ се появяватъ банки отъ синозърнести пъсъчници съ варовитъ цементъ, а подъ тяхъ зърнестъ доломитенъ варовикъ, който по долу преминава въ оолитенъ варовикъ. Целиятъ този догеренъ комплексъ лежи върху триасови образувания.

Горна юрска серия или Малмъ.

Горно-юрската серия, принадлежаща на медитеранската провинция, е не по-малко развита отъ останалите членове на