

на България и особено въ нейнитѣ западни части, гдето креднитѣ пластове изчезватъ съвършено изподъ Терциера и кватернерния льосъ. Само на изтокъ отъ р. Витъ излизатъ креднитѣ скали покрай Дунава, а на западъ нашата система е скрита или изподъ крайдунавската белюга (льосъ), или пъкъ изподъ сарматскитѣ наслаги. Около Търново една часть отъ Долна Креда е покрита съ старо терциерни или еоценски седименти; сжщото се вижда още по-хубаво къмъ Черно море, гдето Горна и Долна Креда изчезватъ съвършено подъ Еоцена.

Кредната система въ България покрива скали отъ разии пѣ-стари формации. Само малкъкъ погледъ върху геологическата карта на страната ще ни даде исканитѣ сведения. Достатъчно е ако се каже, че пластоветѣ на „тая геологическа система почиватъ върху архайски и палеозойски терени, върху червени пѣсъчници и конгломерати отъ долно-триасова, както и върху варовици отъ долно-срѣдна триасова възраст; тѣ лежатъ още и върху юрски разновидности наслаги.

Пластоветѣ на долно и горно-кредната система сж отбелязени на много мѣста съ типични и изобилни вкаменелости, но има мѣста, гдето такива се срѣщатъ твърде нарѣдко, или пъкъ съвършено отсъствуватъ, за което голѣми мжчноти се срѣщатъ при опредѣлението на възрастта имъ. Такъвъ е случая съ флишообразнитѣ пѣсъчници, твърде разпространени въ нашитѣ предѣли, въ които презъ последнитѣ години, освенъ увжглени, карбонизирани растителни остатъци се намѣриха и нѣкои фосили, които удовлетворително разрешаватъ възрастта имъ.

Голѣма часть отъ нашето отечество, на югъ отъ Балканската верига, изложена е била на голѣми подморски и континентални ерупции, презъ времетраянето на кредниятъ периодъ, особено къмъ завършването му и терциерната или неозойската група. Тѣй като еруптивната дѣятелность е оставила следитѣ си въ подбалканската зона измежду горно-креднитѣ пластове съ *Stenonia tuberculata* Desfr. sp., *Inoceramus Cripsi* Mant., *Inoceramus lobatus* Münster, *Exogyra* aff. *Columba* Desch. и др., а последнитѣ алтерниратъ съ андезитнитѣ туфове въ цѣлата тая област, нѣма съмнение, че подморското наслагане е наченало да се извършва едновременно, презъ траянето на сенонската епоха. Но дали изливането на младо-еруптивнитѣ скали е станало едновременно въ цѣла-