

*ras d'Orb.*, *Hoplites Leopoldinus d'Orb.*, *Hoplites spiniger v.* Koenen, *Crioceras Duvalii Lév.*, *Crioceras angulicostatum d'Orb.*, *Crioceras aff. Villiersianum d'Orb.*, *Duvalia dilatata Bleinv.*

Разпространение. — Неокомътъ преминава отъ с. Салашъ, на западъ отъ Бълградчикъ, отъ Сърбия и се явява съ синкаво-варовити мергели. Пластовете му се направляватъ отначало въ тъсна ивица къмъ юго-източна посока, минаватъ презъ с. с. Върбово, Репляна, Превала, Бълимътъ, разширяватъ се къмъ Фердинандъ и достигатъ до лѣвия бръгъ на р. Ботуния, между селата Охридъ и Палилула. Въ тези неокомска зона най-често се намиратъ: *Phylloceras Thetys d'Orb.*, *Phylloceras infundibulum d'Orb.*, *Lytoceras subfimbriatum d'Orb.*, *Lytoceras cfr. striatisulcatum d'Orb.*, *Haploceras cfr. Grasianum d'Orb.*, *Hoplites cryptoceras d'Orb.*; *Hoplites neocomiensis d'Orb.*, *Hoplites cfr. tardefurcatus Leym.*, *Crioceras Duvalii Lev.*, *Hibolites pistilliformis Blainv.*

На изтокъ и юго-изтокъ отъ р. Ботуния неокомските синкави мергели оставатъ прикрити подъ по-млади кредни обраzuвания, върху едно доста голъмо пространство, тѣ се явяватъ при с. Батулци, въ най-западния жгътъ на Ябланска долина и сѫ отворени къмъ р. Витъ. Въ тѣхъ често се срѣщатъ характерните хотривски фосили като: *Haploceras Grasianum d'Orb.*, *Holcostephanus astierianus d'Orb.*, *Holcost. Jeanuoti d'Orb.*, *Hoplites cryptoceras d'Orb.*, *Crioceres Duvalii Lev.*, *Ancyloceras Matheroni d'Orb.*, *Hibolites pistilliformis Bleinv.*

На югъ отъ с. Ябланица сѫщите афльориратъ отъ дветѣ страни на Малкия Искъръ, после около Черни и Бѣли Витъ, гдето се откриватъ Долния и Горния Неокамъ, отбелязани съ *Phylloerees aff. semisulcatum d'Orb. sp.*, *Lytoceras aff. subfimbriatum d'Orb.*, *Hoplites (Berriasella) aff. privasensis Pictet.* и други.

Къмъ изтокъ неокомските пластове се откриватъ върху доста голъма широчина северно отъ Балканските височини въ Троянско и Севлиевско, въ Габровско, Дрѣновско, Търновско, Еленско и по на изтокъ къмъ Тозлуга. Въ Троянско и Севлиевско констатирани сѫ и двата ката на неокома съ следната валанжениенска и хотривска фауна: *Phylloceras aff. Ernesti Uhl.*, *Lytoceras intemperans Math.*, *Lyt. subfimbriatum d'Orb.*, *Lyt. Phestus Mathr.*, *Lyt. quadrisulcatum d'Orb.*, *Holcostepha-*