

*nus astierianus* и др. Неокомскитѣ пластове, които се намиратъ въ Дръновско, Търновско и Еленско, се отличаватъ то же съ типична фауна, отъ която заслужва да се споменатъ: *Lytoceras subfimbriatum* d'Orb., *Haploceras Grassianum* d'Orb., *Costidiscus aff. recticostatus* d'Orb., *Holcostephanus astierianus* d'Orb., *Holcost. aff. Carteroni* d'Orb., *Hoplites cryptoceras* d'Orb., *Hoplites aff. pexiptichus* Uhl., *Hoplites (Berriasella) cfr. privasensis* Pict. sp., *Crioceres Duvalii* Lév., *Duvalia dilatata* Blainv., *Duvalia Orbignyana* Duval., *Hibolites pistilliformis* Blainv.

Въ Дервентския Балканъ на югъ отъ Ески-Джумая твърде ясенъ е неокамскитѣ катъ, а при това и богатъ на хотривски фосили; подъ него се разкрива и валанжениенскитѣ подкатъ. Въ истоимения проходъ мергелнитѣ воровици отличаватъ се съ синикавъ, сиво-пепеливъ па даже и съ пепеливо-зеленикавъ или червеникавъ цвѣтъ. Преди Крумовитѣ врата между тѣхъ излизатъ и глинено-мергелни пѣсъчници, а къмъ срѣдата на прохода и брекчасти мергелни варовици. Най-обикновенитѣ фосили въ тая твърде надиплена планина сж: *Aptychus Didayi* Соq., *Aptichus Studeri* Oaster, *Haploceras Grassianum* d'Orb., *Holcostephanus astierianus* d'Orb., *Hoplites cryptoceras* d'Orb., *Hoplites aff. pexiptychus* Uhl., *Hoplites (Acanthodiscus) aff. Michaelis* Uhl., *Crioceras Duvalii* Lév., *Duvalia dilatata* Blainv.

Северно отъ Дервентския Балканъ, цѣлиятъ басейнъ на р. Врана състои по най-вече отъ сиво-пепеливи, зеленикави и пепеливо-бѣли неокомски мергели, въ които *Holcostephanus astierianus* d'Orb., *Crioceres aff. villersianum* d'Orb., *Hibolites pistilliformis* Blainv., *Duvalia dilatata* Blainv. сж едни отъ най-честитѣ форми. Около Ески-Джумая, а именно въ Бѣли баиръ, освенъ разни *Cephalopoda* намиратъ се въ изобилие и разни *Crinoidea*, *Echinoidea*, *Brachiopoda*, *Bivalva* и *Gestropoda*.

На изтокъ и на югъ отъ Шуменското плато Горния и Долния Неокомъ е представенъ съ синкаво-пѣсъчливи мергели ту повече, ту по-малко твърди. Тѣ се разкриватъ по най-вече въ Теке-дере или Акъ-су, а на изтокъ отъ Шуменъ въ долината на р. Мадара и се отличаватъ съ следната цефолоподна фауна: *Nautilus neocomiensis* d'Orb., *Aptychus angulicostatus* Pictet et Loriol, *Phylloceres Tethys* d'Orb., *Haploceras Grassianum* d'Orb., *Holcostephanus astierianus* d'Orb., *Holcost.*