

то привличатъ вниманието на всѣкиго поради своето добро качество за лесно и правилно обработване и затвърдяване отпосле, лежатъ подъ ужълто-червеникавия захаровиденъ варовикъ съ кремъкъ.

Около Разградъ и на изтокъ отъ този градъ баремскиятъ кагъ е представенъ съ оолитни, слабо червеникави варовици (Башъ-бунаръ); обаче по-горнитѣ хоризонти, съставени отъ глинени, пѣсъчни варовици и мазни глини могатъ да се видятъ на изтокъ отъ града къмъ табията, надъ българскитѣ гробища, а най-горнитѣ — съставени отъ мергелни варовици, се откриватъ при Такеджикъ и въ сипеитѣ къмъ Сарж баиръ подъ желѣзнопжтната линия. Въ сиво-пепеливитѣ, често мергелни и пѣсъчно-мергелни варовици, въ които не се изключаватъ и глауконитни зрънца често се намиратъ: *Psammochinus Montmobini* Desor., *Pyrina pygaea* (Ag.) Desor., *Heteraster Couloni* d'Orb., *Rhynchonella Gibbsiana* (Sow.) Dev., *Terebratula Montoniana* d'Orb., *Arca Gabrielis* d'Orb., *Astarte aff. Beaumontii* Leym., *Isocardia neocomiensis* (Ag.) d'Orb., *Cyprina Marcousana* de Loriol., *Panopaea neocomiensis* (Leym.) d'Orb., *Pleurotomaria neocomiensis* d'Orb., *Natica bulimoides* d'Orb., *Natica praelonga* Desh., *Phylloceras Thetys* d'Orb., *Macroscaphites aff. Ivanii* Puzos, *Heteroceras Astieri* d'Orb., *Haploceras aff. Melchioris* Tietze, *Desmoceras difficile* d'Orb., *Desm. aff. Boutini* Math., *Holccdiscus incertus* d'Orb., *Hol. Caillandianus* d'Orb., *Hol. aff. Perezi* d'Orb., *Hol. Destaldianus* d'Orb., *Hol. astieriformis* Sayn, *Hol. aff. Geronimae* Herm. sp., *Pulchellia aff. Zindigi* Karst. и пр.

Къмъ с. Хърсово подъ мергелитѣ и пѣсъчно-мергелнитѣ на мѣста глауконитни варовици лежатъ и ужълто-глинени, оолитни варовици.

Баремскитѣ пластове отъ алпийския типъ, които покриватъ голѣми части отъ Шуменския окръгъ, както и отъ Аккадънларската и Добричката околии, не се различаватъ много отъ споменатитѣ до сега скали. Въ долинитѣ на много мѣста се откриватъ бѣли захаровидни или ситно кристализирани твърди варовици, припокрити съ ужълти дребно и едрозърнести и отчасти оолитни варовици, като н. пр. около с. с. Карапилитъ, Кочмаръ, Сукуюджукъ, на западъ отъ Куртбунаръ и пр. Пѣсъчни и глинено-пѣсъчни варовици се намиратъ около селата Серж-Махмудъ, Арнаутъ-Куюсу въ Емиръ-