

тоя катъ сж измити на нѣколко мѣста: а) въ цѣлия приимателенъ басейнъ на рѣката Скъта отъ с. Оходенъ до севернитѣ поли на Веслецкото бърдо; б) между Долна и Горна Бѣшовица и в) отъ дветѣ страни на Пънега, западно отъ с. Радомирци, надъ Искѣра

б) Медитерански типъ.

До като въ западната и централната часть на царство България ценоманскитѣ катъ е представенъ съ варовитѣ фацисъ, въ Източния и отчасти въ Средния Балканъ той се намира въ съвсемъ други условия и се явява въ видъ на пѣсчливъ фацисъ. Съставенъ е най-вече отъ пѣсчници, отъ глинено пѣсчни наслаги, между които изпъкватъ конгломератни пѣсчници па даже и сами конгломерати. Порѣдко въ тѣхъ се забелязватъ тънки банки отъ синкави гжсти и нечисти варовици, въ които често се срѣщатъ орбитолини.

Гледайки на литологическия характеръ на ценоманскитѣ пластове въ Източния Балканъ, предвзрително можемъ да кажемъ, че наслойването е станало при по-други обстоятелства, отколкото утаяването на варовицитѣ, отъ сжщата възраст на западъ и юго-западъ отъ Плѣвненъ. Детритичнитѣ седименти, състоящи отъ конгломерати и пѣсчници доказватъ, че близо до тая часть на България се е намиралъ нѣкога нѣкой старъ масивъ и че образуването на тия седименти се е извършило въ плитки морски води. Освѣнъ това тѣ носятъ още и бележитѣ на южния, или медитеранския типъ.

Въ Ценомана на Източния Балканъ нѣй първо мѣсто заематъ едрозърнеститѣ пѣсчници, въ дебели банки, съдържащи люспи отъ бѣла слюда. До като сж прѣсни тѣ сж сиво-пепеливи до синкави, а ужълто-бѣлизневи когато останатъ изложени на атмосфернитѣ агенти Тия пѣсчници иматъ свойство да се рѣзпадатъ въ кржгли голѣми или малки топки. Такива се забелѣзватъ на много мѣста въ Източния Балканъ.

Измежду дебело наслоенитѣ пѣсчници има и плочести — по-твърди пѣсчници чиито зърна сж по-ситни отъ