

същности е измита и отъ тѣхъ сж останали само нѣколко ерозивни форми подобни на колосални гжби.

На югъ отъ с. Ичера до Юзбашийската чешма, въ мѣстността „Чуката“ ценоманскитѣ пластове се явяватъ въ видъ на тъмни и сиво-пепеливи глинени шисти, между които излизатъ и синкави, варовити-глинени пѣсъчници; както еднитѣ така и другитѣ съдържатъ изобилно *Orbitolina concava* Lam.

При Байчова долапъ, близо с. Градецъ въ дебело наслоенитѣ пѣсъчници намиратъ се дебело-стѣни *Cerolithium*-и Сжщитѣ се потеглятъ и къмъ западъ; тѣ сж наблюдавани между Стара-рѣка и Кечи-дере и лежатъ както и на югъ отъ Елена надъ неокомски синкави мергели и пѣсъчници. Въ Еленско ценоманскитѣ едрозърнести кварцови пѣсъчници, които въ по-високъ хоризонтъ преминаватъ въ бѣли, ситно-зърнести, простиратъ се въ тѣсна зона, почти непрекъснато отъ изтокъ къмъ западъ въ Трѣвненско и Габровско. Въ свѣтлитѣ ситно зърнести пѣсъчници между селата Новачене и Шубецитѣ, на югъ отъ Елена и по на западъ при „Вонещата вода“ намѣрена е доста типична ценоманска фауна състояща отъ: *Exogyra columba* Lam., *Exogyra lateralis* Nilss., *Pecten inserens* Gein., *Terebratulula cepillata* d'Arch., *Cidaris vesiculosa* Gldf. и пр.

2. Туронски катъ.

Измежду членоветѣ на неокретацейската серия най-слабо развитъ се показва туронския катъ съ северо-европейскн типъ. Огранич нъ е на малко пространство, между рѣкитѣ Витъ и Осъмъ, и то само на югъ отъ Плѣвень. Една малка частъ отъ него е препокрита отъ млада терциерния виндобонски катъ, а по-голѣмата потъва къмъ северъ подъ сенонскитѣ варовици. Отъ къмъ южната страна туронскитѣ глинени варовици лежатъ върху ценоманскитѣ варовици.

Малкитѣ рѣкички Чернелка, отъ къмъ западъ, и Тученица, отъ къмъ изтокъ, пресичатъ доста дълбоко туронския теренъ и отварятъ хубави профили, по които може доста добре да се изучатъ стратиграфскитѣ отношения на този