

*ris sub-vesiculosa* d'Orb., *Peltastes aff. heliophorus* Cott., *Salenia aff. sentigara* Gray, *Cyphosoma magnificum* Agass., *Galerites abbreviatus* Lam., *Nucleolites oblongus* Desor, *Hemiaster Regulusanus* d'Orb., *Serpula gordialis* Schloth., *Meliceritites graeilis* Röm., *Membranipora irregularis* Hag sp., *Crania Ignabergensis* Retz., *Rhynchonella difformis* d'Orb., *Rh. alata* v. Buch, *Terebratulina strictula* Mant., *Terebratella aff. Santonensis* d'Arch., *Pecten Nilsoni* Glof., *Janira quinquecostata* Sow. sp., *Lima decussata* Münst., *Inoceramus Cuvieri* Sow., *Ostrea hippopodium* Nils., *Ostrea plicifera* Coq., *Arca ligeriensis* d'Orb., *Pectunculus Marrothianus* d'Orb., *Trigonia aff. scabra* Lam., *Crassatella regularis* d'Orb., *Cardium productum* Sow., *Pleurotomaria turbinoides* d'Orb., *Turbo royanus* d'Orb., *Natica cretacea* Gldf., *Turritella difficilis* d'Orb., *Nautilus sublaevigatus* d'Orb. sp., *Baculites incurvatus* Duj., *Desmoceras* n. sp., *Pachydiscus aff. colligatus* v. Binkh., *Mortoniceras Texanum* F. Röm. sp., *Peroniceras subtricarinatum* d'Orb. sp. и пр.

Профилитѣ, които се разкриватъ на много мѣста около Шуменъ, като при Шанъ-Каясж, надъ Кьошкетовѣ, на Илчовъ — и Цигански баиръ и пр. доказватъ за еднообразието на сенонскитѣ пластове въ Шуменското плато. Сжщитѣ профили се наблюдаватъ и по възвишенитѣ плоскости на северо-западъ отъ Шуменъ. къмъ селата Орта-кьой, Черенче, както и къмъ Фишекъ. По голѣмата плоска възвишеностъ която се издига източно отъ Шуменското плато е съставена тоже отъ сжщитѣ сенонски пластове, разположени едни надъ други както и въ Шуменското плато, обаче нѣй-горнитѣ сенонски варовици (Aturien) като да сж измити, или ако нѣщо е останало нейде отъ тѣхъ, тѣ навѣрно се явяватъ въ видъ на осамотени части надъ пѣсчниците и пѣсчнитѣ варовици, или пѣкъ биватъ препокрити съ еоценски образувания.

При с. Кюлевча надъ баремскитѣ мергели се показватъ бѣли и възжълти, едрозърнести, малко или много варовити кварцови пѣсчници, чиито зърна достигатъ до грахова величина. Тѣ съдържатъ отчасти и глаукснитни зрънца. Обърнатитѣ къмъ западъ вертикални стѣни на тия твърде слабо наклонени къмъ юго западъ пѣсчници, украсени сж отъ атмосфернитѣ ерозии съ разни стълбовидни, изпъкнали