

ядки отъ черъ кремъкъ и пластоветъ имъ сж наклонени слабо къмъ северна посока; въ срѣдата свѣтли варовици, които съдържатъ на мѣста кварцови и зелени глауконитни зърна, а най-горе сиво-пепеливи мергели и мергелни варовици, отчасти кремъчни и бѣдни на фосили. Най-обикновенитѣ вкаменелости около Плѣвненъ сж: *Cidaris Faujasi* Desor, *Echinoconus aff. vulgaris* d'Orb., *Hemipneustes aff. striato-radiatus* d'Orb., *Crania antiqua* Defr., *Crania striata* Defr., *Rhynchonella plicatilis var octoplicata* Sow., *Pecten aff. virgatus* Nils., *Janira aequicostata* d'Orb., *Inoceramus aff. mytilloides* Mant, *Pinna cretacea* Schloth., *Ostrea auricularis* Gein., *Pectunculus obsoletus* Gldf., *Sphaerulites aff. Styriacus* Zitt., *Cardium productum* Sow., *Cytherea polymorpha* n. forma, *Pholadomya aequivalvis* Gldf. sp., *Pleurotomaria aff. perspectiva* Mant., *Natica cretacea* Gldf.

На северъ отъ Плѣвненъ Горниятъ Сенонъ е представенъ съ мергелни варовици и мергели, които само тукъ тамъ се откриватъ подъ орната прѣстъ. Къмъ Дунава скалитѣ се скриватъ изподъ дебелия льосъ, за да се покажатъ изново къмъ Сомовитѣ и Никополъ. Тѣ се откриватъ и по дѣсния брѣгъ на р. Витъ, измежду с. с. Кацамуница и Крета въ доста дебели банки изпълнени на мѣста съ вкаменелости.

На изтокъ отъ Сомовитѣ по цѣлия брѣгъ, бѣлеятъ се изключително горно-сенонски образувания, които се завършватъ къмъ Дунава съ отсѣчени стѣни. Скалитѣ се явяватъ въ видъ на порозни и други варовици, богати на фосили, между които *Hemipneustes* итѣ *Janira*-итѣ и *Ostrea*-итѣ като да взематъ надмощие надъ другитѣ. По-низко скалитѣ ставатъ кредоподобни и въ тѣхъ се явяватъ кременни редове по най-вече отъ тъмна боя. Въ белитѣ кредоподобни скали източно отъ р. Осъмъ изпъкватъ тежки кременни ядки въ неправилни форми, но непоказватъ вече онова сериално нареждане както къмъ Сомовитѣ; тѣ се виждатъ по-разхвърлени въ кредата и сж въ по-голѣмо изобилие отколкото въ Саржарското бърдо, или по на западъ, а при това отличаватъ се и съ по-свѣтла боя; кремъкътъ е восъченожълтъ и въ заоблени кжсове, а не ржбать и остъръ както къмъ Сомовитѣ.

Сенонскитѣ катъ на изтокъ отъ Никополъ явява се съ по-високи стрѣмни скали, отколкото на западъ отъ този