

Sternb., *var. latior* v. d. Marck. Напоконъ отъ фораминиферитѣ могатъ да се споменатъ въ мергелнитѣ варовици разни *Miliolidae*, *Cristellaria* sp., *Textularia* (*Textularia globifera* Reuss), *Orbulina* sp., *Globigerina* (*Glob. cretacea* d'Orb.), *Rosalina* (*Ros. canaliculata* Reuss, *Ros. aff. ammonoides* Reuss) и други.

Мастрихтски подкатъ (Горенъ Атурненъ).

Горната частъ отъ Атурския катъ или *Maestrichtien*'а явява се въ най-високитѣ гребени на Източния Балканъ и локално само въ нѣкои партии на Централния.

Въ състава на този подкатъ взиматъ участие: твърди, дребно-зърнести, а отчасти и гъсти свѣтли варовици, които се провличатъ въ тѣсна или широка ивица, насочена отъ Камчийската планина къмъ западъ, почти по цѣлата дължина на Източния Балканъ до Кипиловската планина. Стръмно отсѣчената ивица къмъ северъ не е на всѣкъде спазена цѣла; тя е прекъсната или измита на нѣколко мѣста. Отъ Камчийскитѣ височини къмъ западъ тя изтънява доволно, па даже се прекъсва въ Карнобатската и Върбишката планина, като заема въ Котленската планина изново първоначалната си широчина, особено на северъ отъ Котелъ, между Тритѣ-вѣтра и Кипилово.

Споредъ вънкашния си изгледъ споменатитѣ варовици, които лежатъ трансгресивно върху ценоманскитѣ пѣсчници на Балкана, приличатъ на много по-стари, отъ колкото сж тѣ въ сжщностъ. Тѣ съдържатъ на мѣста и кварцови зрънца както и кремъчни ядки, а съ увеличително стъкло въ тънки препарати въ тѣхъ се разпознаватъ фораминифери и бриозои твърде хърактерни за горнитѣ части на Сенонския катъ, като *Textularia*, *Globigerina*, *Rosalina* и особено *Orbitoides*-и, а отъ бриозоитѣ разни *Lunulites*-и. Тия варовици могатъ да се нарекатъ Орбитоидно-Бриозойски.

Въ Източния Балканъ *Orbitoides*-и съ *Textularia* и *Bryozoa* констатирани сж най-първо въ зърнеститѣ и гъститѣ варовици съ кварцови и глауконитни зрънца, които се откриватъ покрай коритото н 1 р. Елешница. Тѣзи варовита