

тиратъ *Textularia globifera* Reuss, *Globigerina cretacea* d'Orb. и други фораминифери, както и бриозои, каквито се срѣщатъ въ преходната зона между орбитоиднитѣ варовици и кампанскитѣ образувания. Орбитоиди обаче сж намѣрени до сега само около Габрєво въ скалитѣ на Петкова нива и надъ с. Бойновци.

Въ бѣлизняво, сиво-пепеливитѣ и доста гжститѣ варовици отъ Петкова нива, които съдържатъ и ситни кварцови зрънца, разпознаватъ се разнovidни и многобройни орбитоиди, между които първо мѣсто заема *Orbitoides media* d'Arch., а така сжщо и други фораминифери, както и бриозои. Въ варовицитѣ пъкъ надъ с. Бойновци орбитоидитѣ немогжтъ специфично да се опредѣлятъ.

Газавски фацисъ.

Къмъ медитеранския типъ принадлежатъ още всички ония горно-кредни образувания, които се разпростиратъ въ подбалканската зона западно отъ Софийската котловина къмъ Сливница, въ Царибродско, Трънско и Брѣзничко, носящи много отъ сжщественитѣ бѣлези на газавскитѣ образувания въ Източнитѣ Алпи.

Въ състава на газовскитѣ пластове взематъ участие освенъ слюдни пѣсчници, пѣсчни глини и мергели отъ флишки типъ, сиво-пепеливи, зеленикѣви и червенкѣви мергелни шисти, които сж едни отъ първитѣ петрографски елементи на кампанския подкатъ, влизатъ още и слабо-варовити, бѣлизняви и червенкави пѣсчници съ лимонитни конкреции, синкави и черни глинени шисти съ каменни вжглица отъ незначителна дебелина, каквито се намиратъ въ бърдото Козякъ, около с. с. Габєрь, Ялботина, Недѣлище, Филиповци, Парамунъ и пр. Пѣсчно-глинени варовици, пѣсчници и пѣсчни конгломерати които освенъ кварцови частици, съдържатъ още и варовити кжсове и пр., съ една дума съставятъ на тия пластове е твърде промѣнливъ въ хоризонтална посока. По-вечето отъ тия материали наслагали сж се покрай брѣговетѣ на горно-кредното море, или пъкъ въ заливъ, въ който сж се изливали водитѣ на нѣкои доста голѣми рѣки. Въ такава брахична вода наслоили сж се утайкитѣ заедно съ живущитѣ въ нея: *Cyrena*, *Turri-*