

sis Toula, Strombus Tournoneri Bayan, *Cassidaria carinata* Lam., *Buccinum stromboides* Herm. и пр.

По пътя къмъ Ичира предъ Молловата кория, при втората чешма излизатъ и бѣли едрозърнести пѣсъчници и подъ тѣхъ глинени пластове. Сѫщите се виждатъ и въ самата кория, а следъ нея близо сотирския пътъ тѣ сѫ изпълнени съ дребни нумулити (*Nummulites aff. variolaria* Sow.) и *Bivalvae*.

Горенъ Еоценъ (Barthonien).

Като бартониенски могатъ да се взематъ всички ония пѣсъчни и пѣсъчно глинисти пластове, които се откриватъ край морето въ южните части на Бургазкия заливъ, между Пода (Поросъ) и Карантината (Ченгене скеля), особено къмъ западната му част. Тѣ сѫ едни синкави доста твърди пѣсъчници съ неясна стратификация и съ вънкашностъ подобна на еруптивните скали. Освенъ тия пѣсъчници, върху сѫщия брѣгъ излизатъ още и пѣсъчно-глинисти пластове, както и зеленикави туфове, които алтериранть не само помежду си, но още и съ пѣсъчниците. Цвѣтътъ на последните къмъ Карантината е ужълтъ и зеленикавъ, а седиментарната серия наклонена къмъ северо-изтокъ.

Горно-еоценските седименти около Карантината, край морето изглеждатъ пѣсъчно-варовити и зеленикаво пѣсъчни; тѣ се измѣняватъ доста неправилно помежду си и въ тѣхъ често се забелязватъ и варовити конкреции, както и достатъчно фосили, между които има и нумулити. По изобилни сѫ обаче фосилитѣ въ западния брѣгъ, между които ще спомена само следните:

Stylocaenia microstella Mich. sp., *Sismondia aff. altovilensis* (Defr.) Cott., *Ostrea flabellula* Lamk., *Ostrea ventilabrum* Glld., *Corbis major* Bayen, *Corbis subpectunculus* d'Orb., *Velates Schmidelianus* Chem., *Natica caepacea* Lamk., *Natica patula* Desh., *Deshayesia aff. parisiensis* Raulin., *Cerithium plicatum* Brug., *Terebellum fusiforme* Lamk., *Buccinum aff. decapatum* Desh., *Valuta aff. neglecta* Desh. и пр.