

Приабонъ.

Като преходни пластове отъ Еоценъ къмъ Олигоценъ могатъ да се взематъ еогенскитѣ образувания около Кара-тепе и с. Мугрисъ както и при Чимусъ въ Бургаскитѣ околности. Тѣ сж въ правата смисълъ приабонски и като таква ще ги опишемъ тука.

1. Около Кара-тепе и Мугрисъ. — На юго-западъ отъ Бургазъ и върху източнитѣ поли на Кара-тепе, отдалеко се бѣлѣятъ стрѣмнини, съставени отъ пѣсчано-варовити и мергелни образувания, изпълнени съ приабонски фосили.

Къмъ южната граница на тоя седиментаренъ поясъ, най-горе излизатъ пѣсчано-глинени варовици съ нумулити и ортофрагмини, които, като разпукани и раздробени, образуватъ на мѣсто една бѣла варовита прѣстъ, въ която особено се вижда фораминиферната фауна.

Подъ тия разтрошени варовици афльориратъ зеленикави, отчасти пѣсчни мергели, въ които фораминиферитѣ почти отсъствуватъ. Разхвърленитѣ пѣкъ червеникави кжсове отъ пѣсчници варовици по стрѣмнината на сжщата възвишеностъ произлизатъ навѣрно отъ горнитѣ пластове на Кара-баиръ.

Около чешмата „Камара“ пѣсчливиятъ варовикъ е повечето ужълто-окрозно обагрень и освенъ фораминифери, съдържа още бодли и плочи отъ ехиниди, остатъци отъ бивалви, гастроподи и други. Тия скали се разкриватъ тука на десетина и повече метра, но, като стѣпили въ разрушение, на много мѣста тѣ биватъ преобърнати въ бѣла, пѣсчна прѣстъ.

Седиментарнитѣ приабонски образувания около Кара-тепе, които се заврѣшватъ на полвинъ километъръ предъ ханчето въ новитѣ лозя, наклонени сж къмъ ююи. и лежатъ върху младитѣ еруптивни скали на сжщото тепе. Тѣ съдържатъ малки частици отъ андезитни скали, които могатъ да се наблюдаватъ въ тънкитѣ препарати на варовицитѣ.

Макаръ и прекжснатъ, сжщиятъ варовикъ излиза и около с. Мугрисъ, както и на долната страна на селото къмъ езерото; но той се явява и на юго-западъ отъ Мугрисъ къмъ Аязмата, въ който сж намѣрени: нумулити, ко-