

отъ втория медитерански катъ; обаче сжщитѣ, оставени въ водата или изложени на въздуха, постепенно затвърдяватъ и могатъ безопасно да се разнасятъ по течението на рѣката, безъ да се раздробяватъ. Тия виндобонски варовити глини излизатъ на мѣста изнадъ рѣчното ниво до 1'50 м. Въ тия именно глини особено изобилни сж фосилитѣ около с. Припѣлжене.

5. **Около Старопатица.** — Най-западниятъ афльорментъ на Виндобонския катъ въ Северозападна България се намира при с. Старопатица (Видинско). И тукъ, както и въ двата предидущи локалитета, той лежи непосредно върху долно-кредни, баремски пѣсъчници и се отличава съ твърде разнообразна, богата фауна, която следъ плѣвенската иде на второ мѣсто у насъ.

Въ дола на източната страна на Старопатица, както и въ всички напрѣчни долове, които се спущатъ отъ югъ къмъ северъ, ето съ какви слойове се открива подъ недебела почва вториятъ Медитерански катъ:

Най-горе излиза чакълъ и пѣсъкъ, на които дебелината достига отъ 0'80 м. до 1 метъръ, а подъ тѣхъ веднага следва — сиво-пепеливъ тегелъ, не по-дебелъ отъ два метра, който е доста богатъ на фосили. Пластоветѣ на този мергелъ не показватъ хомогенностъ и въ тѣхъ излизатъ пѣсъчливо-варовити тънки банки, както и мергелни конкреции. Първитѣ могатъ да се нарекатъ конгломерати отъ фосили, между които особено често се забелязватъ, доста ясно фораминиферитѣ: *Heterostegina costata* d'Orb., *Ampyistegina Haueri* d'Orb.; а мергелнитѣ конкреции не съдържатъ почти никакви остатъци.

Подъ сиво-пепеливия тегелъ, въ основата се показватъ едни синкави мергели, безъ да съдържатъ каквито и да било фосили.

Старопатишката фауна, събрана въ главния долъ и въ напрѣчнитѣ второстепенни долове, е твърде разнообразна. Тя се отличава съ особено богатство на фораминифери и главно на *Nodosaria*, *Cristellaria*, *Polystomella*, *Amphistegina* и *Heterostegina*. Отъ коралитѣ имаме *Stylophora*, *Syzygophyllia*, *Heliastrea*, *Stephanophyllia* и др. Ламелибранхиалната фауна е представена съ 32 вида, а гастроподната съ 94 вида.