

отъ *Spaniodon Barbotii* Stuckenb. Въ по-ниските хоризонти на спаниодонския катъ не сѫ изключени и твърдите мергели, които понѣкога биватъ тоже богати на *Spaniodon*, но има и мергели безъ тѣзи вкаменености.

Пѣсъчниците, проче, въ този катъ твърде много вариатъ, както по съставъ, така и по структура, а при това тѣ биватъ варовити, мергелни, оолитни, а на мѣста даже се измѣняватъ и съ мергелни слойове.

Между спаниодонските кварцови пѣсъчници, както на северъ, така сѫщо и на югъ отъ Девненския лиманъ, се намиратъ пластове и отъ сладководни образувания, отбелязани съ типични форми като:

*Planorbis aff. laevis* v. Klein, *Planorbis aff. pseud ammonius* Schl., *Lymnaeus Zlatarskii* Touia, *Lymnaeus* sp. и др.

Редътъ на спаниодонските пластове не е навсѣкоже еднакъвъ. На югъ отъ Варна между Галата и шосето, което води къмъ Камчията, върху варовитите оолитни пѣсъчници съ *Pecten*, *Helix* и др. отъ чокракска възрастъ следватъ безъ прекъсване едрозърнести кварцови пѣсъчници съ варовитъ цементъ и варовити мергелни прослойки; надъ тѣхъ лежи около 0·40 м. оолитенъ варовикъ, а надъ него цѣлъ комплексъ отъ твърди и меки, дребно и едрозърнести кварцови пѣсъчници, разположени въ тѣнки и дебели банки. Между тия ясни сѫ пѣсъчните слойове съ лъжливо наслагване, а въ прослойки се показватъ и варовити пѣсъчници съ добре цементирани зърна. Къмъ срѣдата на пѣсъчната серия фосилитъ ставатъ по-изобилни, и то по най-вече *Spaniodon Barbotii* Stuckenb.; но тия не сѫ правилно разпределени въ пѣсъчниците: на мѣста сѫ изобилни, на други по-редки или никакви. Варовитите пѣсъчници къмъ платото съставляватъ дебели банки единъ цѣлъ, твърде скалистъ поясъ, който се забелязва отъ далеко. Най-горе излизатъ пакъ пѣсъци и пѣсъчници, между които ясни сѫ тѣнките отъ пѣсъчливи мергели.

Като спаниодонски могатъ да се взиматъ и пластовете на западъ отъ Евксиноградъ. Тамъ излизатъ варовити мергели, които се цепятъ въ тѣнки пластове, па и твърди варовити банки, после пѣсъчно глинени пластове и глинени