

стове, може да се наблюдава преобладаването на родовете *Tapes* и *Mastra*. *Mastra podolica* Eichw. и *Tapes gregaria* Parsch взиматъ най-живо участие измежду пластовете на сарматскитѣ образувания, и то не само въ северо-западната частъ на княжеството и около долното течение на Искѣра, но особено изобилно се намиратъ около Черно море. Напротивъ *Ervilia podolica* Eichw. по-рѣдко се срѣща въ западната половина на нашето отечество. *Cardium*-итѣ се виждатъ доста разпространени; видовете *Cardium protractum* Eichw., *Card. obsoletum* Eichw., *Card. plicatum* Eichw., сж общи и за дветѣ половици (западна и източна) на царството. *Donax lucida* Eichw., е намѣренъ само около долното течение на Искѣра, но за това родовете *Turbo* и *Trochus* сж изобилни. *Turbo Barbotii* Toula идва въ голѣми количества, както въ Видинско така и въ Балчишко. *Trochus pictus* Eichw., *Tr. biangulatus* Eichw., *Tr. anceps* Eichw., *Tr. Voronzovii* d'Orb., *Tr. biangulatus* Eichw., *Tr. Celinae* Andz., *Tr. quadristriatus* Dub., *Tr. Poppelackii* Partsch сж намѣрени на западъ отъ Плъвенъ къмъ р. Тимокъ, а *Trochus Bouéi* Toula, *Tr. cfr. Adelaie* d'Orb., *Tr. quadristriatus* Dub., *Trochus* n, sp., констатирани сж около Балчикъ, Отъ рода *Nerita* имаме три вида: *Nerita Grateloupiana* Feh., *Ner. picta* Feh. *Ner. subglobosa* Eichw. Отъ *Monodonta* два вида: *Mon. angulata* Eichw., *Mon. manilla* Andrz. и само една *Rissoa*, а именно *Rissoa inflata* Andrz.

Въ западната частъ на Сарматския басейнъ родътъ *Cerithium* е изобилно представенъ, а въ Добруджа и около Черно море той се явява свършено рѣдко. Отъ него могатъ да се споменатъ: *Cerithium pictum* Bast., *Cer. rubiginosum* Eichw., *Cer. nodoso-plicatum* M. Hörnes, *Cer. Diboisii* M. Höroes, *Cer. disjunctum* Sow., *Cer. plicatum* Brug. *Cer. Zeuschneri* Pusch, *Cer. bijudum* Eichw., *Cerithium* n. sp.

Родътъ *Buccinum* е богатъ на видове и въ дветѣ половици на нашето отечество; въ западната половина сж познати: *Buccinum duplicatum* Sow., *Buc. baccatum* Bast., *Buc. Verneuilii* d'Orb., *Buc. Verneuilii* var. *bulgarica* n. f., *Buc. (Usita) miocenicum* Michti, *Buccinum* n. sp. (aff. *Buc. dissitum* Eichw.), а въ източната: *Buccinum angustatum* Baily, *Buc. aff. Verneuilii* d'Orb., *Buc. cfr. Jacquemardii* d'Orb., *Buccinum* n. f. (?) (aff. *Buc. duplicatum* R. Hörnes (Sow.)), *Buccinum* n. sp.

*Columbella (Mitrella) scripta* Bell., *Columb. (Mitrella) aff.*