

ситнозърнести пъсъчни варовици, въ чиито пластове се забелязва и лъжливо наслагване на пъсъчните зърна. Същите банки на мяста съдържат и мидести брекчи, въ които взематъ особено участие тънко черупчестите конгерири, а между тяхъ най-често може да се разпознае видътъ *Congeria subcarinata* Desh. Така също върху долнокредни варовици лежатъ конгерийските пъсъчни варовици при с. Долно-Манастирци не далеко Бъла.

Ако да не бъше покритъ съ лъсть целиятъ този предѣлъ къмъ Дунава, по-лесно можеха да се изучатъ понтийските пластове, заедно съ припадающата имъ фауна, и да се сравнятъ съ истовременната на съседна Ромъния.

Понтийскиятъ катъ се разкрива върху по-голѣми пространства отъ дѣсната страна на Ломската долина, на югъ и юго-изтокъ отъ Русе. Неговите пластове, съставени преимуществено отъ пъсъци, чакъль, а по-малко отъ глини и туфозенъ варовикъ, могатъ да се наблюдаватъ около последния градъ, източно отъ с. Кула, при чифлика Батмѫшъ, въ изкопите на желѣзнопжтната линия, около с. с. Липникъ, Абланово и пр., а достигатъ на изтокъ близо до с. с. Червена вода, Дол. Абланово и Гагаля, а на западъ се приближаватъ къмъ Дунава и Ломъ, но безъ да стигнатъ тяхните брѣгове.

Дебелината на конгерийските пластове около Русе не е твърде голѣма; тя може да има, най-много, около шестъ метра. Най-хубавите профили въ тия образувания могатъ да се видятъ въ Изворъ-дерене не далеко с. Красенъ, въ посока къмъ Червена-вода.

По-важните фосили въ конгерийските пъсъци около Русе сѫ:

*Dreissensia* cfr. *angusta* Rouss., *Congeria subcarinata* Desh., *Congeria subcarinata* var. *Bodenica* Androuss., *Vivipara Neumayeri* Brus., *Vivipara bifarcinata* Bieltz., *Hydrobia* cfr. *vitrella* Bruss.

Младотерциерните образувания около Русе споредъ вкаменелостите си могатъ да се причислятъ къмъ Понтийския катъ и то къмъ Камжшбурунските пластове на Андрушова въ Герганския полуостровъ, които се отличаватъ съ *Congeria subcarinata* Desh. Но у насъ не е намѣренъ фаунистъ на Валенциеннезиевите глини и мергели, а само фа-