

рока левантинска ивица отъ с. Тополово къмъ Бодрово (Босилеградско), въ която взематъ участие ситнозърнести, тън-
 кослойни, жълти пѣсъчни материали, главно бѣли, сиво-пе-
 пеливи ронливи пѣсъчници, размѣсени на мѣста съ гли-
 нести пѣсъци; ситниятъ пѣсъкъ се замѣнява тукъ тамъ съ
 едрозърнестъ и преминава даже въ чакълъ. Лъжливитѣ на-
 слоения на много мѣста сж характерни за пѣсъчните ма-
 териали, а между глинениѣ пластове забелязватъ се и
 малки прослойки съ вжглища. Въ полузатвърдѣлитѣ пѣ-
 съци и пѣсъчни глини, преобърнати въ пѣсъчници, намѣрени
 сж при с. Дипсизъ голю парчета отъ кжтници на *Mastodon*
arvernensis Croiz et Job., — а на с-з. отъ това село, около
 с. Ахматово единъ цѣлъ заденъ кжтникъ отъ сжщия масто-
 донъ, но отъ младо животно, чиито жби още не сж из-
 трити отъ дѣвката.

Около Хасково върху гнайсовитѣ скали лежатъ дебели
 пѣсъци и глинени пластове, малки или ронливи пѣсъчници
 и глинени варовици преобърнати въ пепеливо бѣла прѣстъ.
 Въ тѣхъ е намѣренъ жбъ отъ *Hipparion* и остатъци отъ
Cervidae. Последнитѣ сж покрити въ по-горно ниво съ пѣ-
 съчни, глинени и варовити материали. Къмъ Марица подъ
 Каяджишкото равнище намиратъ се и битуминозни глинени
 шисти съ тънки лигнитни жилки. Както въ Борисовградско,
 така и въ Хасковско, левантинскитѣ пѣсъчни и глинени
 пластове заедно съ раздробенитѣ землясти варовици сж
 спазили първоначалното си хоризонтално положение.

Върху лѣвия брѣгъ на Марица, около Меричлери, се
 откриватъ по най-вече глинени пластове, но заедно съ тѣхъ
 идатъ още мергелни и пѣсъчни слоеве. Въ Меричлери ле-
 вантинскитѣ образувания лежатъ на нѣкои мѣста непосред-
 но върху трахитни туфове. По на северъ отъ селото, въ сж-
 щия теренъ, показватъ се и лигнитни каменни вжглища,
 които почиватъ върху синкави и зеленикави глини, въ гор-
 нитѣ си части доста пѣсъчливи. Както въ еднитѣ, така и въ
 другитѣ, намиратъ се разни планорбиси (*Planorbis aff. Cornu*
Brogn., *Pl. aff. glaber* Joffr.) и лимнеи (*Limnaea aff. pa-*
lustris Müll.).

На северъ отъ Търново-Сейменъ отъ дветѣ страни на
 Сазлж-дере намиратъ се почти изключително левантински
 образувания, обаче като покрити повечето съ плодна, орна