

Пиргосъ (Русенско) кости и жби отъ *Rhinoceros tichorchi-nus* Cuv.; въ чакъла на р. Бѣли Ломъ при Разградъ остатъци отъ *Elephas primigenius* Blum., а клики и жби отъ сжщия *Elephas* на нѣколко мѣста въ Южна България.

Плайстоценскитѣ образувания доста типични сж въ горната часть на Искърската долина. Въ Рила пл. покрай тази рѣка се забелязватъ въ Дилувиума три флувио-галциални тераси, а по на северъ отъ тая планина тѣ сж редуцирани най-първо на две, а по-после на една тераса, две сж при Пасарелъ и при влизането на Искъра въ Софийската котловина.

Надъ Панчерево виждатъ се отъ лѣвата страна на рѣката две дилувиални тераси. Измежду материалитѣ на горната забелязватъ се доста едри гранитоидни блокове и кжсове отъ гнайси и кристалинни шисти, които водитѣ навѣрно сж довели отъ горното течение на Искъра; съ тѣхъ заедно идатъ и блокове отъ червени пѣсъчници, но въ по-малкъ размѣръ отъ първитѣ. Тия материали растлани сж по Витошкитѣ поли къмъ западъ и къмъ с. Слатина, но до колкото се вижда, тѣ не достигатъ до София. Другата или по младата тераса, съставена отъ по-ситния материалъ на сжщитѣ скали, достига по на западъ и се открива подъ почвата на много мѣста около София и въ града надъ Левантинскитѣ пѣсъци. Тия две тераси отговарятъ на дветѣ залежавания въ Рилската планина, а между тия съвлада времето на силнитѣ ерозии.

Къмъ южнитѣ поли на Балкана въ дилувиалния чакълъ на Софийската котловина при Св. Врачъ наблюдава се само една тераса, а така сжщо и въ Искърския проломъ и въобще отъ Балкана, та до устието на Искъра въ Дунава. Рѣдки сж дилувиални тераси и въ притоцитѣ на Искъра.

Кватернернитѣ тераси сж доста интересни на западъ отъ Софийската котловина.

Въ предѣла „Високъ“ на с-и. отъ Царибродъ особено ясни сж въ плайстоценския материалъ три тераси, разположени отъ дѣсната страна на р. Височица, отъ с. Каменица до с. Славиня, а отъ лѣвата тѣ сж измити и отнесенни. Въ тѣхъ взематъ участие дребни и едри кжсове отъ кристалолитестести скали, палеозойски глиненици, червени пѣсъчници, юрски и кредни варовици. Сжщо три тераси сж развити и въ източната половина на Царибродската котловина: първата