

морскитѣ води, които сж го заобикаляли, защото той се пропукавалъ на много пѣти въ различна посока, надлъжъ по процѣпитѣ сж ставали отвѣсни размѣствания и сж хлѣтвали голѣми негови части. Въ хлѣтнатитѣ котловини навлизали водитѣ на моретата, които заобикаляли масива или възниквали въ тѣхъ сладководни езера. Многочислени топли минерали извори и млади еруптивни скали ни сочатъ мѣстата, дѣто сж станали процѣпитѣ и размѣстванията, а старостъта на седиментнитѣ скали, ни сочатъ въ коя геолошка епоха сж навлизали моретата въ потъналитѣ части на Родопския масивъ.

Между потъналитѣ части на Родопския масивъ най-важно мѣсто заематъ срѣдната Марицина низина между Бѣловската и Търново-Сейменската клисура на сѣверъ и Бѣломорската низина на югъ.

Когато въ дилувиално врѣме възникнало Бѣло море чрѣзъ потъване, засѣгнати били южнитѣ краища на Родопския масивъ. Крайбрѣжнитѣ острови Тасосъ, Самотраки, Имбросъ и дори отдалечениятъ Лемносъ сж родопски острови, сж височини на потънали части отъ Родопитѣ.

Въ географско и геолошко отношение Западна Тракия съставя частъ отъ Родопския масивъ, съставя нераздѣлна частъ отъ българската земя. Издънки отъ южнитѣ Родопи стигатъ съ планината Каракушъ-Дагъ Бѣло море и отдѣлятъ долинага на Марица отъ Гюмюрджинското поле, което съставя източната частъ на Бѣломорската низина. Много буйни потоци, които извираатъ отъ южнитѣ склонове на южнитѣ Родопи, навлизатъ стрѣмитело въ низината и прѣзъ нея стигатъ брѣговетѣ на Бѣло море.