

и бубарството е навсѣкждѣ добрѣ развито. Сѣятъ на много мѣста памукъ, сусамъ и макъ; културата на тѣзи индустриални растения може да се увеличи и подобри. Топлината на Бѣломорската низина е толкозъ голѣма, че и подъ сѣнката на дървета зрѣятъ хубаво житнитѣ растения.¹⁾ Добрѣ наредени опитни станции въ Бѣломорската низина, ржководени отъ добри директори италиянци или французи могатъ да подтикнатъ отглеждането на всички културни растения на срѣдиземноморската областъ, включително и лимонитѣ. Но по-голѣмата частъ на низината не е разработена, пространни сж въ нея пущинацитѣ, въ които се издигатъ ту високи дървета, гжсто прѣплетени съ повитаци, които напомнятъ тропически гори, ту гжсти храсталаци, често вѣчно зелени, що служатъ за паша на добитѣкъ и скривалища за многочисленнитѣ чакали, единственитѣ хищни животни въ тая покрайнина. Голѣми пространства сж заети отъ паша, която подпомага скотовѣдството въ Родопитѣ. Пространнитѣ мочури съ своитѣ многобройни комари сж причинители на злокачественна треска, която измжчва населението, намалява работоспособността му, засилва смъртността.

Бору-Гьоль раздѣла бѣломорската низина на два дѣла: западенъ и източенъ. Въ западния дѣлъ се намира грачъ Ксанти, а въ източниятъ Гюмюр-

¹⁾ Въ Бѣломорската низина, въ околнитѣ Гюмюрджинска градска, Гюмюрджинска селска и Ксантийска, прѣзъ 1918 година сж произведени 22,777,500 кгр. зърнени храни, главно пшеница; засѣти били съ тютюнъ 21,332.4 декара, съ памукъ 1,262.5 декара (изключително въ Гюмюрджинска селска, съ сусамъ 1,092.2 (сжщо въ Гюмюрджинска градска и селска околини); съ лозя — 12,512 декара (главно въ Гюмюрджинско); черници се сѣятъ само въ Гюмюрджинско (438 декара).