

чинѣ-тѣ си ѡтробѣ, то начне да гльта понѣкога по малко сокъ (водяво) отъ маткѣ-тѣ, у коијто е затворено. То е, рекълъ бы чловѣкъ, пръво начяло за бозане и протуряне. Кога ся роди дѣте-то пръва-та му храна обыкновено быва водява, майчино-то млѣко или куластра-та. То е въ сѫщинѣ-тѣ си еднакво съ водяво-то, что е у маткѣ-тѣ. Попослѣ пакъ млѣко-то става все погѣсто и толкова похранително, колкото повече наягка стомахъ-тѣ та става побряденъ за протуряне. Ако дѣте-то не бѣде съ тѣжъ честь да си намѣри отъ майчины-ты грѣды пръвѣ-тѣ хранѣ, а ижъ добые отъ кѣрмилницѣ, която е вече много понапрѣжъ отъ майка му родила, то тогава лесно може-ся случи та слабый еще стомахъ на дѣтенце-то да не полесе тѣжъ хранѣ, сир. млѣко-то на кѣрмилницѣ-тѣ. Еще повече трѣбува да ся внимае, кога има да ся отглѧда дѣте-то безъ нѣнкѣ; тогава прѣзъ пръвы-ты мѣсяци быва да ся дава на дѣте-то само каплива храна, а никога да му ся не дава гѣста или тврьда. Отроче-то едва може да суче и да гльта, а не гваче (дѣвче); стомахъ-тѣ му нѣма мошь за да смеле и протури това, чтото протури стомахъ-тѣ на отрасълъ чловѣкъ; чтото гльтне дѣте-то, то трѣбува да бѣде вече готово за протуряне.

Храна за новородено дѣте найсгодна, сир. найприлична на майчино-то му млѣко е краве или или козе млѣко, разрѣдено съ водѣ, хладно и подсладено съ малко захарь. Мнозина съвѣтуватъ да бѣде това краве или козе млѣко все отъ единѣ сѫщѣ подойници. И наистинѣ млѣко-то отъ единѣ сѫщѣ кравѣ наймного врѣме остана все еднакво,