

гато намѣримъ число да може да ся дѣли на дѣлителя; напр.

$$\begin{array}{r|l}
 149,1,1,2 & 327 \\
 1308 & 456 \\
 \hline
 01831 & \\
 1635 & \\
 \hline
 01962 & \\
 1962 & \\
 \hline
 0000 &
 \end{array}$$

Въ тоя примѣръ купъ отъ три цифры на дѣлимо-то 149 е' число по-слабо отъ дѣлителя 327 та не може да ся раздѣли; за това притурямъ и другъ-тъ цифръ отъ дѣлимото 1 та изеднажъ дѣлѣж 1491 и намирамъ чястно 4, кое-то умножено съ дѣлителя 327 дава произведение 1308, та остая отъ дѣлений купъ остатѣкъ 183; при него свалямъ другъ цифръ 1 отъ дѣлимото, та дѣлѣж 1831 и намирамъ ново чястно 5 и така нататѣкъ.

49. — Кога свалимъ отъ дѣлимо-то еднѣ цифръ, на сама или заедно съ остатѣкъ, не може да ся раздѣли съ дѣлителя, тогава въ чястно-то ся туря 0 за да ся покаже че нѣма отъ оня рядъ единицы, и свалямы вторъ цифръ; ако не излѣзе пакъ число, кое-то да може да ся раздѣли, турямы изново 0 въ чястно-то и пакъ свалямы другъ цифръ и така нататѣкъ, докль излѣзе число, кое-то да ся дѣли на дѣлителя.

примѣръ:

$$\begin{array}{r|l}
 378,2,5,6 & 94 \\
 376 & 4024 \\
 \hline
 00225 & \\
 188 & \\
 \hline
 376 & \\
 376 & \\
 \hline
 000 &
 \end{array}$$