

изотермически-тѣ линіи*), но трѣба да земе въ съображеніе широта-та и изотермически-тѣ линіи заедно съ господствующе-то направлениѣ на вѣтрове-тѣ и количество-то на пара-та, коя-то тѣ принасятъ.

§. 141. Но за да бѫдемъ поб-ясни, ний за прибавленіе на всички вече приведены случаи, да земемъ още за пр. О-въ Мадагаскаръ на источнія брѣгъ на Африка. Този островъ лежи мѣжду 12° и 26° Ю. Ш. Той ся намѣрва въ область-та на Ю. З. пас-сатны вѣтрове, и както въ Бразилія тѣзи вѣтрове като идѣтъ отъ кѣмъ море-то дуhatъ перпендику-лярио на брѣжна-та му линія. Отъ С. кѣмъ Ю. той є пресѣченъ отъ планински хребетъ и поради това стѣстеніе-то на пара-та въ него є изобилно и расти-телность-та є Амазонска. Мозамбикскы протокъ, кой-то го отдѣля отъ Африка, не є достаточно широкъ, за да може да напои съ пара тѣзи вече отчасти исх-налы вѣтрове, кои-то по тѣзи причина достигать материка като относително сухи вѣтрове. Отъ тука, макаръ и да є еднаква широта-та, произлѣзва забѣ-лѣжителна-та разница мѣжду флора-та и фауна-та на Мадагаскаръ и фауна-та и флора-та на близкы-тѣ Африкански брѣгове. Също тый Ирландія отнема отъ вѣтрове-тѣ пара-та, коя-то тѣ въ противень случай щѣхъ да принесжть прѣзъ канала Св. Георгія; а О-въ В. Британія още поб-много гы лишава отъ тѣзи пара, коя-то тѣ быхъ принесли прѣзъ Сѣверно-то море и расподѣлили по брѣгове-тѣ на континента. Въ Вестъ-Портъ, кой-то є на Западнія брѣгъ на Ирландія пада два пъти поб-много дъждь, отъ колео-то въ Теллау на Источнія брѣгъ и на съща-та широта. Освѣнь това зими-тѣ въ Ирландія сж нѣколко градусы поб-

*) Изотермически линіи ся наричатъ линій-тѣ, на кои-то срѣдни-та температура за 1 мѣс. или за 1 година є еднаква.