

Каква земи́ж обы́ча синецѣтія звѣздель?

Той обы́ча дебелѣж, чернѣж, клисавѣж, а дол-
ня-та да бѣде процѣдителна—да пропу́ща презъ
себя си дѣждовниж-тѣ водѣж.

Какъ трѣба да ся оре за синецѣтія звѣздель?

За него трѣба да ся оре дѣлбоко и подирѣ
плуга пу́щѣтъ въ сѣщѣж-тѣ брѣздѣж рало, за
да можи да разорява долни́ж-тѣ земи́ж, безъ да
и́ж смѣсва съ горни́ж-тѣ; трѣба да ся очисти
земя-та отъ корены и да ся натори съ тлѣсть
торѣ кой можи да раздребнява земи́ж-тѣ; за-
що-то звѣзделя ще трае нѣколко годинѣ на-
редѣ, за това трѣба да улови дѣлбоки ко-
рѣни, и да бѣди на за́вѣтно мѣсто и корена
му да недостига до мочорливѣ земи́ж.

Тѣзи трѣва услабѣва-ли земи́ж-тѣ много?

Тя много и́ж услабѣва, а най вѣчѣ услабѣва
долни́ж-тѣ земи́ж, въ кои́ж сѣж' корѣни-тѣ и́.

*Като ся отвѣди, подирѣ колко годинѣ пакъ мо-
жи да ся сѣе на сѣщѣж-тѣ нивѣж?*

Земя-та трѣба да ся остави да си почини
нѣколко годинѣ, и тогасѣ пакъ да ся сѣе.

До колко порасѣва синецѣтія звѣздель?

Той порасѣва до тры педы и повѣчѣ и на сѣко
колѣнце пу́ща киткѣж синѣ цѣвѣтъ, кой, като пре-
цѣвти, завѣрзва сывы, криво-кѣдравы чушчици.

Колко вида е жѣлто-цѣвтія звѣздель?

Жѣлто-цѣвтія звѣздель или сладка-та дете-
лина *m. cirulina* е два вида: единѣ скорозреѣжъ
а другій кѣснозрѣѣжъ.

Какѣж земи́ж обы́ча и той?

И той обы́ча сѣщѣж-тѣ, както и сине-цѣвтія,
нѣ нѣму понася и варовита-та земя, и онаѣ,
коѣ отъ долу си има варовити камѣни.

На кои слабы́ земи той стаѣа?