

ние и за врѣние, натопилъ топлотѣра у едно *студено смѣсеніе*. *) Оттова живакъ-тъ спаднахъ много по-низко подъ рядовнахъ-тъ точкѣ за мръзненіе; тѣхъ точкѣ той нарекатъ *искусственнахъ шокѣ за мръзненіе*, и нѣ забѣлѣжилъ съ 0, а рядовнахъ-тъ точкѣ, дѣ-то ледъ мръзне, забѣлѣжилъ съ 32° ; а пакъ точкѣ-тъ за врѣние, коя-то ся издвига по-горѣ на 180° забѣлѣжилъ съ 212° . — Каза ся, че живакъ-тъ еще повече ся слѣга и спада, дѣ-то е по-студено, отъ колко-то е студъ-тъ на леда, кога ся топи; затова по Реомюровы-ты и по Целсіевы-ты топлотѣры, има и стѣпни *исподъ* обыкновеннахъ-тъ точкѣ за мръзненіе, коя-то, както казахмы, е забѣлѣжена съ 0. Тія стѣпни *исподъ* точкѣ-тъ за мръзненіе наричатъ ся *стѣпни* за *студъ*, а пакъ стѣпни-ти надъ точкѣ-тъ за мръзненіе ся наричатъ *стѣпни* за *горяцинахъ*.

Стѣпни-ти надъ точкѣ-тъ за мръзненіе ся забѣлѣжвагъ съ бѣлѣгъ + (плюсъ), а стѣпни-ти исподъ точкѣ-тъ за мръзненіе ся забѣлѣжвагъ съ — (минусъ). Кога-то казвамы колко стѣпни топлинахъ или студъ имамы, трѣбува всякога да казвамы и по кой топлотѣръ сме ги намѣрили. А кога-то пишемъ колко топлинахъ или студъ има забѣлѣжамы обыкновенно само прѣвѣхъ-тъ буквѣ на имя-то, чій-то е топлотѣръ-тъ: на пр. $+ 20^{\circ}$ Р.

ще рече 20 стѣпниѣ топлинахъ по Реомюровый топло-



Ф. 28. Ф. 29. Ф. 30.

*) Химическо съединеніе на двѣ тѣла, при кое-то много ся губи топлина-та, нарича ся *студено смѣсеніе*. На пр. ако ся